

Doel

Behandeling van ongecompliceerd dragerschap met Meticilline resistente Staphylococcus aureus (MRSA) [1]. Als er een reservoir in de thuissituatie aanwezig is (huisgenoten of dier), dient deze gelijktijdig te worden mee behandeld.

Reikwijdte

Huisartsenpraktijk bij patiënten indien

- er geen sprake is van een actieve infectie en/of actieve huidlaesies **en**
- de MRSA in vitro gevoelig is voor het toe te passen antibioticum **en**
- er geen lichaamsvreemd materiaal aanwezig is dat een verbinding vormt tussen milieu interieur en milieu exterieur zoals urinekatheter, fixatuur externa etc **en**
- het dragerschap **uitsluitend** in de neus is gelokaliseerd.

Voor behandeling van gecompliceerd dragerschap wordt verwezen naar de SWAB richtlijn [1]

Definities

Huisgenoten	Personen die overdag en 's nachts in hetzelfde huis als de index persoon verblijven en gemeenschappelijk gebruik maken van slaapkamer, badkamer, woonkamer en/of keuken.
SWAB	Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid www.swab.nl

Werkwijze behandeling ongecompliceerd dragerschap

Behandeling start in principe na overleg met arts-microbioloog van Noordwest Ziekenhuisgroep.

Vaststellen reservoirs

- bepaal d.m.v. MRSA screening wie tegelijkertijd met de index moet(en) worden behandeld

Wijze van behandeling

- Douche (of was) de huid gedurende 5 dagen uitsluitend met betadine shampoo 75 mg/ml
 - bij overgevoeligheid voor jodium: chloorhexidine 4% zeepoplossing (40 mg/ml) voorschrijven
 - in bad gaan is niet toegestaan
 - was de haren (baard en snor), kam en borstel dagelijks met betadine shampoo
 - dagelijks schoon ondergoed, schone kleding, schone washandjes en handdoeken gebruiken
 - trek elke avond schoon nachtgoed aan (pyjama of ondergoed)
 - verschoon het bed volledig op dag 1, 2 en 5 van de kuur
 - draag tijdens de kuur bij voorkeur kleding die in de wasmachine op 40° C of 60° C gewassen kan worden
- Breng gedurende 5 dagen, 3 maal daags mupirocine neuszalf aan
 - breng de zalf aan met behulp van een wattenstaafje
 - de zalf niet te diep aanbrengen: alleen het 'neuspeutergebied'
 - gebruik indien nodig papieren zakdoekjes en was de handen na het snuiten van de neus

Beoordeling effectiviteit behandeling dragerschap

- Controlekweken worden afgenomen:
 - 1^e keer tenminste 48 uur na het staken van de behandeling
 - 2^e en 3^e keer met een tussenpoos van minimaal 7 dagen
- Indien een of meerdere kweken positief
 - geen verdere controlekweken afnemen en i.o.m. arts-microbioloog bepalen of behandeling herhaald kan worden.