


Azathioprine in bloed

Synoniemen	Imuran, Azafalk	
Analysemethode	HPLC (volgens Dervieux) (gevalideerde methode)	
Uitgevoerd door	Extern	
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: 2x per week, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker.	
Aanvraagformulier	ziekenhuisapotheek	
Benodigd materiaal	1 buis van 10 ml Li-heparine bloed afgenomen in een buis zonder gel (groene dop). versturen op ijs! niet centrifugeren	
Afnametijd dal-spiegel	n.v.t.	
Afnametijd top-spiegel	n.v.t.	
Afnameconditie Verzendconditie	NIET AFNEMEN OP VRIJDAG afnemen op ijs. gekoeld versturen versturen op ijs!	
Bewaarconditie	gekoeld bewaren	
Monsterontvangst	Laboratorium van de ziekenhuisapotheek	
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 21 dag Poliklinisch: maximaal 21 dagen	
Referentiewaarden	Dal:	6-TGN > 300 pmol/8.10 ⁸ RBC 6-MMP < 5700 pmol/8.10 ⁸ RBC
	Top:	-
	Toxisch vanaf	6-TGN > 600 pmol/8.10 ⁸ RBC 6-MMP > 5700 pmol/8.10 ⁸ RBC
Bepalingsgrens	6-TGN 100 pmol/8.10 ⁸ RBC 6-MMP 100 pmol/8.10 ⁸ RBC	
CTG code	072866	
Achtergrondinformatie	Zie TDM monografie NVZA: Thiopurines	
Contactpersoon	F.Ph. Mulder, ziekenhuisapotheker QA/QC f.mulder@nwz.nl tel:7376 Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar.	
	Laboratorium van de Ziekenhuisapotheek tel: 072-5483590	

Wijzigingen t.o.v. vorige versie

02-06-2022 NP: Benodigd materiaal geactualiseerd