Noordwest Ziekenhuisgroep

Azathioprine in bloed

Synoniemen	Imuran, Azafalk	
Analysemethode	HPLC (volgens Dervieux) (gevalideerde methode)	
Uitgevoerd door	Extern	
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: 2x per week, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker.	
Aanvraagformulier	ziekenhuisapotheek	
Benodigd materiaal	2 buizen van 4 ml Li-heparine bloed afgenomen in een buis zonder gel (groene dop) . of 1 buis van 10 ml Li-heparine bloed afgenomen in een buis zonder gel (groene dop). **versturen op ijs!** **niet centrifugeren**	
Afnametijd dal-spiegel	n.v.t.	
Afnametijd top-spiegel	n.v.t.	
Verzendconditie	gekoeld versturen **versturen op ijs!**	
Bewaarconditie	gekoeld bewaren	
Monsterontvangst	Laboratorium van de ziekenhuisapotheek	
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 21 dag Poliklinisch: maximaal 21 dagen	
Referentiewaarden	Dal:	6-TGN > 300 pmol/8.10^8 RBC 6-MMP < 5700 pmol/8.10^8 RBC
	Top:	-
	Toxisch vanaf	6-TGN > 600 pmol/8.10^8 RBC 6-MMP > 5700 pmol/8.10^8 RBC
Bepalingsgrens	6-TGN 100 pmol/8.10^8 RBC 6-MMP 100 pmol/8.10^8 RBC	
CTG code	072866	
Achtergrondinformatie	Zie TDM monografie NVZA: Thiopurines	
Contactpersoon	F.Ph. Mulder, ziekenhuisapotheker QA/QC f.mulder@nwz.nl tel:7376 Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar.	
	N. Pirgon Dökmeci, teamleider pirgon-dokmeci@nwz.nl tel:3590	

Wijzigingen t.o.v. vorige versie
24-09-2018 PB: referentiewaarden aangepast aan extern laboratorium