


## Azathioprine in bloed

Synoniemen	Imuran, Azafalk	
Analysemethode	HPLC (volgens Dervieux) (gevalideerde methode)	
Uitgevoerd door	Extern	
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: 2x per week, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker.	
Aanvraagformulier	<a href="#">ziekenhuisapotheek</a>	
Benodigd materiaal	2 buizen van 4 ml Li-heparine bloed afgenomen in een buis zonder gel (groene dop) . of 1 buis van 10 ml Li-heparine bloed afgenomen in een buis zonder gel (groene dop). <b>versturen op ijs!</b> <b>niet centrifugeren</b>	
Afnametijd dal-spiegel	n.v.t.	
Afnametijd top-spiegel	n.v.t.	
Afnameconditie Verzendconditie	<b>NIET AFNEMEN OP VRIJDAG</b> <b>afnemen op ijs.</b> gekoeld versturen <b>versturen op ijs!</b>	
Bewaarconditie	gekoeld bewaren	
Monsterontvangst	Laboratorium van de ziekenhuisapotheek	
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 21 dag Poliklinisch: maximaal 21 dagen	
Referentiewaarden	Dal:	6-TGN > 300 pmol/8.10 <sup>8</sup> RBC 6-MMP < 5700 pmol/8.10 <sup>8</sup> RBC
	Top:	-
	Toxisch vanaf	6-TGN > 600 pmol/8.10 <sup>8</sup> RBC 6-MMP > 5700 pmol/8.10 <sup>8</sup> RBC
Bepalingsgrens	6-TGN 100 pmol/8.10 <sup>8</sup> RBC 6-MMP 100 pmol/8.10 <sup>8</sup> RBC	
CTG code	<a href="#">072866</a>	
Achtergrondinformatie	Zie TDM monografie NVZA: <a href="#">Thiopurines</a>	
Contactpersoon	F.Ph. Mulder, ziekenhuisapotheker QA/QC <a href="mailto:f.mulder@nwz.nl">f.mulder@nwz.nl</a> tel:7376 Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar.	
	Laboratorium van de Ziekenhuisapotheek tel: 072-5483590	
Wijzigingen t.o.v. vorige versie		
26-10-2021 PB: toegevoegd: "niet afnemen op vrijdag"		