


Bupropion in serum

Synoniemen	Wellbutrin, Zyban	
Analysemethode	LC-MS/MS (gevalideerde methode)	
Uitgevoerd door	Extern	
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: 1x per week, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker.	
Aanvraagformulier	ziekenhuisapotheek	
Benodigd materiaal	4 ml stolbloed afgenomen in een buis zonder gel (rode dop)	
Afnametijd dal-spiegel	vlak (maximaal 30 minuten) voor toediening	
Afnametijd top-spiegel	n.v.t.	
Verzendconditie	kamertemperatuur	
Bewaarconditie	kamertemperatuur	
Monsterontvangst	Laboratorium van de ziekenhuisapotheek	
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 14 dagen Poliklinisch: maximaal 14 dagen	
Referentiewaarden	dal	bupropion: > 37 mcg/L hydroxy-bupropion: > 575 mcg/L somspegel bupropion + hydroxy-bupropion: 225 – 1500 mcg/L
	Top:	-
	Toxisch vanaf	-
Bepalingsgrens		
CTG code	72809	
Achtergrondinformatie	Zie TDM monografie NVZA: Bupropion	
Contactpersoon	F.Ph. Mulder, ziekenhuisapotheker QA/QC f.mulder@nwz.nl tel:7376 Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar.	
	Klinisch Farmaceutisch Laboratorium Tel: 088-085 3590	

Wijzigingen t.o.v. vorige versie

26-08-2022:

verzendconditie aangepast naar informatie extern laboratorium
hyperlinks hersteld