


Cannabis kwantitatief in urine

Synoniemen	vele
Analysemethode	immunoassay (gevalideerde methode)
Uitgevoerd door	Extern
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: dagelijks, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker.
Aanvraagformulier	ziekenhuisapotheek
Benodigd materiaal	5 ml urine afgenomen in een buis zonder boorzuur (gele dop)
	
Afnametijd dal-spiegel	n.v.t.
Afnametijd top-spiegel	n.v.t.
Verzendconditie	geen bijzondere verzendcondities
Bewaarconditie	bepalen binnen 24 uur, anders invriezen
Monsterontvangst	n.v.t.
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 1 dagen Poliklinisch: maximaal 7 dagen
Resultaat	er wordt een ratio bepaald tussen delta-9 THC-COOH en kreatinine. deze ratio wordt in de tijd gevolgd. een toename in ratio van > 50% ten opzichte van de vorige ratio duidt op bijgebruik
CTG code	072812
Achtergrondinformatie	
Contactpersoon	F.Ph. Mulder, ziekenhuisapotheker QA/QC f.mulder@nwz.nl tel:7376 Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar. N. Pirgon Dökmeci, teamleider pirgon-dokmeci@nwz.nl tel:3590
Wijzigingen t.o.v. vorige versie	
08-01-2018 PB: bepaling wordt vanaf nu extern uitgevoerd	