

Cariprazine in plasma

Synoniemen	Cariprazine	
Analysemethode	LC-MS/MS (gevalideerde methode)	
Uitgevoerd door	extern	
Kwaliteitssysteem geïmplementeerd	valt buiten de ISO 15189 scope	
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: 1x per week, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker.	
Aanvraagformulier	ziekenhuisapothek	
Benodigd materiaal	4 ml EDTA bloed afgenomen in een buis zonder gel (paarse dop) opsturen: plasma	
Afnametijd dal-spiegel	vlak (maximaal 30 minuten) voor toediening	
Afnametijd top-spiegel	n.v.t.	
Verzendconditie	geen bijzondere verzendcondities	
Bewaarconditie	geen bijzondere bewaarcondities	
Monsterontvangst	Laboratorium van de ziekenhuisapothek	
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 14 dagen Poliklinisch: maximaal 14 dagen	
Referentiewaarden	dal	10 – 20 mcg/L
	Top:	-
	Toxisch vanaf	40 mcg/L
Bepalingsgrens		
CTG code	072884	
Achtergrondinformatie	AGNP Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Psychiatry: Update 2017	
Contactpersoon	F.Ph. Mulder, ziekenhuisapotheker QA/QC f.mulder@nwz.nl tel:7376 Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar.	
	apothek-laboratorium@nwz.nl tel:088-085 3590	
Wijzigingen t.o.v. vorige versie		
14-04-2023 PB: nieuw		