


Ceftazidim in plasma

Synoniemen	Fortum	
Analysemethode	HPLC	
Uitgevoerd door	Extern	
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker, 1x per week, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker.	
Aanvraagformulier	ziekenhuisapotheek	
Benodigd materiaal	4 ml EDTA bloed afgenomen in een buis zonder gel (paarse dop) . plasma opsturen	
Afnametijd dal-spiegel	vlak (maximaal 30 minuten) voor toediening willekeurig moment bij continue toediening	
Afnametijd top-spiegel	1 uur na toediening	
Verzendconditie	gekoeld versturen	
Bewaarconditie	gekoeld bewaren	
Monsterontvangst	Laboratorium van de ziekenhuisapotheek	
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 2 dagen Poliklinisch: maximaal 2 dagen	
Referentiewaarden	Dal:	ca. 25 mg/L (dosering 2 gram per keer, intermitterend) bij continu infuus: ca. 30 mg/L (dosering 3 gram / 24 uur) bij continu infuus: ca. 40 mg/L (dosering 4 - 6 gram / 24 uur)
	Top:	ca. 125 mg/L (dosering 2 gram per keer, intermitterend)
	Toxisch vanaf	onbekend
Bepalingsgrens		
CTG code	072894	
Achtergrondinformatie		
Contactpersoon	F.Ph. Mulder, ziekenhuisapotheker QA/QC f.mulder@nwz.nl tel:7376 Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar.	
	N. Pirgon Dökmeci, teamleider pirgon-dokmeci@nwz.nl tel:3590	

Wijzigingen t.o.v. vorige versie

30-10-2019 FM: referentiewaarden aangepast aan referentiewaarden extern laboratorium