


Chloorpromazine in serum

Synoniemen	-	
Analysemethode	LS-MS/MS (gevalideerde methode)	
Uitgevoerd door	Intern	
Kwaliteitssysteem geïmplementeerd	Nee Alleen voor Toxicologie	
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker.	
Aanvraagformulier	ziekenhuisapothek	
Benodigd materiaal	4 ml stolbloed afgenomen in een buis zonder gel (rode dop)	
Afnametijd dal-spiegel	n.v.t.	
Afnametijd top-spiegel	n.v.t.	
Verzendconditie	geen bijzondere verzendcondities	
Bewaarconditie	geen bijzondere bewaarcondities	
Monsterontvangst	Laboratorium van de ziekenhuisapothek	
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 14 dagen Poliklinisch: maximaal 14 dagen	
Referentiewaarden	dal	30-300 mcg/L
	Top:	-
	Toxisch vanaf	> 600 mcg/L
Bepalingsgrens	Chloorpromazine 18 - 400 mcg/L	
CTG code		
Achtergrondinformatie		
Contactpersoon	F.Ph. Mulder, ziekenhuisapotheker QA/QC f.mulder@nwz.nl tel:7376 Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar.	
	apothek-laboratorium@nwz.nl tel:3590	
Wijzigingen t.o.v. vorige versie		