


## Clindamycine in serum

Synoniemen	Dalacin	
Analysemethode	LC-MS/MS (gevalideerde methode)	
Uitgevoerd door	Extern	
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: onbekend, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker.	
Aanvraagformulier	<a href="#">ziekenhuisapotheek</a>	
Benodigd materiaal	4 ml stolbloed afgenomen in een buis zonder gel (rode dop)	
Afnametijd dal-spiegel	vlak (maximaal 30 minuten) voor toediening	
Afnametijd top-spiegel	direct na einde infuus IM: 1 – 4 uur na gift Oraal: 45 – 60 minuten na gift	
Verzendconditie	serum gekoeld verzenden	
Bewaarconditie	serum gekoeld bewaren	
Monsterontvangst	Laboratorium van de ziekenhuisapotheek	
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 2 dagen Poliklinisch: maximaal 2 dagen	
Referentiewaarden	Dal:	2 – 15 mg/L
	Top:	5 – 25 mg/L
	Toxisch vanaf	30 – 50 mg/L
Bepalingsgrens	0,6 mg/L	
	57 mg/L	
CTG code	<a href="#">072894</a>	
Achtergrondinformatie		
Contactpersoon	F. Ph Mulder, ziekenhuisapotheker QA/QC <a href="mailto:f.mulder@nwz.nl">f.mulder@nwz.nl</a> tel:7376 Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar.	
	Klinisch Farmaceutisch Laboratorium <a href="tel:3590">tel:3590</a>	
Wijzigingen t.o.v. vorige versie: verzend- en bewaarcondities aangepast		