


## Cotinine in urine

Synoniemen	Nicotine pleister, sigaret, tabak	
Analysemethode	GC-MS	
Uitgevoerd door	Extern	
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker.	
Aanvraagformulier	<a href="#">ziekenhuisapotheek</a>	
Benodigd materiaal	5 ml urine afgenomen in een buis zonder boorzuur (gele dop)	
Afnametijd dal-spiegel	n.v.t.	
Afnametijd top-spiegel	n.v.t.	
Verzendconditie	geen bijzondere verzendcondities	
Bewaarconditie	geen bijzondere bewaarcondities	
Monsterontvangst	Laboratorium van de ziekenhuisapotheek	
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 14 dagen Poliklinisch: maximaal 14 dagen	
	bij de aanvraag wordt standaard een creatinine in urine bepaald om uit te sluiten dat de urine te verdund is voor analyse	
Referentiewaarde	Urine 's morgens: niet rokende omgeving: 0.7 mg/g creatinine = ca. 1.2 µg/L wel rokende omgeving: 8.6 mg/g creatinine = ca. 10 µg/L niet rokende Stadsbewoner urine: 10 (0-64) µg/L deze na 1 uur in rookomgeving: 80 (13-200) µg/L wel roker: 1236 (100-2700) µg/L urine sterke roker: ca. 3000 µg/L urine	
Bepalingsgrens	10 mcg/L	
CTG code	<a href="#">072850</a>	
Achtergrondinformatie		
Contactpersoon	F. Ph Mulder, ziekenhuisapotheker QA/QC <a href="mailto:f.mulder@nwz.nl">f.mulder@nwz.nl</a> tel:7376 Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar. N.Pirgon Dökmeci, teamleider <a href="mailto:pirgon-dokmeci@nwz.nl">pirgon-dokmeci@nwz.nl</a> tel:3590	
Wijzigingen t.o.v. vorige versie		