

Dantroleen in serum

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| Synoniemen | Dantrium | |
| Analysemethode | LC | |
| Uitgevoerd door | Extern | |
| Bepalingsfrequentie | CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker , in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker. | |
| Aanvraagformulier | ziekenhuisapotheek | |
| Benodigd materiaal | 4 ml stolbloed afgenomen in een buis zonder gel (rode dop) |  |
| Afnametijd dal-spiegel | n.v.t. | |
| Afnametijd top-spiegel | n.v.t. | |
| Verzendconditie | geen bijzondere verzendcondities | |
| Bewaarconditie | geen bijzondere bewaarcondities | |
| Monsterontvangst | Laboratorium van de ziekenhuisapotheek | |
| Doorlooptijd | Klinisch: maximaal 14 dagen Poliklinisch: maximaal 14 dagen | |
| Referentiewaarden | Dal: | 0,3 – 1,4 mg/L |
| | Top: | 1 – 3 mg/L |
| | Steady state | 2 – 3 mg/L |
| Bepalingsgrens | | |
| CTG code | 072899 | |
| Achtergrondinformatie | | |
| Contactpersoon | F. Ph Mulder, ziekenhuisapotheker QA/QC f.mulder@nwz.nl tel:3736 Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar. | |
| | N.Pirgon Dökmeçi, teamleider pirgon-dokmeci@nwz.nl tel:3590 | |
| Wijzigingen t.o.v. vorige versie | | |
| | | |