


Disopyramide in serum

Synoniemen	Ritmoforine	
Analysemethode	LC-MS/MS	
Uitgevoerd door	Extern	
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: 1x per week, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker.	
Aanvraagformulier	ziekenhuisapotheek	
Benodigd materiaal	4 ml EDTA bloed afgenomen in een buis zonder gel (paarse dop) Opsturen: plasma	
Afnametijd dal-spiegel	vlak (maximaal 30 minuten) voor toediening	
Afnametijd top-spiegel	n.v.t.	
Verzendconditie	geen bijzondere bewaarcondities	
Bewaarconditie	koel bewaren	
Monsterontvangst	Laboratorium van de ziekenhuisapotheek	
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 14 dagen Poliklinisch: maximaal 14 dagen	
Referentiewaarden	Dal:	Therapeutisch 2 – 5 mg/L
	Top:	-
	Toxisch vanaf	Somspiegel disopyramide + nordisopyramide: 7 mg/L
Bepalingsgrens		
CTG code	072886	
Achtergrondinformatie	Zie TDM monografie NVZA: Disopyramide	
Contactpersoon	F. Ph Mulder, ziekenhuisapotheker QA/QC f.mulder@nwz.nl tel:7376 Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar.	
	N.Pirgon Dökmeçi, medisch analist pirgon-dokmeci@nwz.nl tel:3590	

Wijzigingen t.o.v. vorige versie

25-06-2021: benodigd materiaal, bewaarconditie en referentiewaarden aangepast