


Doxepine in serum

Synoniemen	Sinequan	
Analysemethode	LC-MS/MS	
Uitgevoerd door	Extern	
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: 1x per week, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker.	
Aanvraagformulier	ziekenhuisapotheek	
Benodigd materiaal	4 ml stolbloed afgenomen in een buis zonder gel (rode dop)	
Afnametijd dal-spiegel	n.v.t.	
Afnametijd top-spiegel	n.v.t.	
Verzendconditie	geen bijzondere verzendcondities	
Bewaarconditie	geen bijzondere bewaarcondities	
Monsterontvangst	Laboratorium van de ziekenhuisapotheek	
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 14 dagen Poliklinisch: maximaal 14 dagen	
Referentiewaarden		doxepine: 50 – 150 mcg/L desmethyldoxepine: 50 – 100 mcg/L somspegel doxepine + desmethyldoxepine: 100 – 250 mcg/L
	Top:	-
	Toxisch vanaf	somspegel doxepine + desmethyldoxepine: 400 mcg/L
Bepalingsgrens		
CTG code	72809	
Achtergrondinformatie	Zie TDM monografie NVZA: Tricyclische Antidepressiva	
Contactpersoon	F. Ph Mulder, ziekenhuisapotheker QA/QC f.mulder@nwz.nl tel:7376 Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar.	
	N.Pirgon Dökmeçi, teamleider pirgon-dokmeci@nwz.nl tel:3590	
Wijzigingen t.o.v. vorige versie		