


Doxycycline in serum

Synoniemen	Efracea, Vibramycin	
Analysemethode	HPLC-UV (gevalideerde methode)	
Uitgevoerd door	Extern	
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker.	
Aanvraagformulier	ziekenhuisapotheek	
Benodigd materiaal	4 ml EDTA bloed afgenomen in een buis zonder gel (parse dop)	
Afnametijd spiegel	Afname minimaal 4 uur na gift. Spiegelafname 6 weken na aanvang van therapie is gebruikelijk, maar steady state wordt al na circa 4 dagen bereikt.	
Verzendconditie	kamertemperatuur	
Bewaarconditie	opslag Lab Apotheek: 2-8°C	
Monsterontvangst	Laboratorium van de ziekenhuisapotheek	
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 14 dagen Poliklinisch: maximaal 14 dagen	
Referentiewaarden	Dal:	5 – 10 mg/L
	Top:	
	Toxisch vanaf	30 mg/L
Bepalingsgrens		
CTG code	072894	
Achtergrondinformatie		
Contactpersoon	F. Ph Mulder, ziekenhuisapotheker QA/QC f.mulder@nwz.nl tel:7376 Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar.	
	Klinisch Farmaceutisch Laboratorium Tel: 088-085 3590	

Wijzigingen t.o.v. vorige versie

30-08-2022:

extern lab aangepast, waardoor het type afnamebuis is gewijzigd
hyperlinks hersteld