


## Flunitrazepam in serum

|                                  |   |  |
|----------------------------------|---|--|
| Synoniemen                       | -   |  |
| Analysemethode                   | LC-MS/MS  |  |
| Uitgevoerd door                  | Extern  |  |
| Bepalingsfrequentie              | CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker<br>Normaal: 1x per week, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker. |  |
| Aanvraagformulier                | <a href="#">ziekenhuisapothek</a>   |  |
| Benodigd materiaal               | 4 ml stolbloed afgenomen in een buis zonder gel (rode dop)  |  |
| Afnametijd dal-spiegel           | vlak (maximaal 30 minuten) voor toediening  |  |
| Afnametijd top-spiegel           | n.v.t.  |  |
| Verzendconditie                  | geen bijzondere verzendcondities  |  |
| Bewaarconditie                   | geen bijzondere bewaarcondities   |  |
| Monsterontvangst                 | Laboratorium van de ziekenhuisapothek   |  |
| Doorlooptijd                     | Klinisch: maximaal 14 dagen<br>Poliklinisch: maximaal 14 dagen  |  |
| Referentiewaarden                | Dal:  | 10 – 15 mcg/L  |
|                                  | Top:  | -  |
|                                  | Toxisch vanaf   | 50 mcg/L   |
| Bepalingsgrens                   |   |  |
| CTG code                         | <a href="#">072805</a>  |  |
| Achtergrondinformatie            | Zie Toxicologie behandelinformatie NVZA: <a href="#">Benzodiazepinen</a>  |  |
| Contactpersoon                   | F. Ph Mulder, ziekenhuisapotheker QA/QC <a href="mailto:f.mulder@nwz.nl">f.mulder@nwz.nl</a> tel:7376<br>Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar.                    |  |
|                                  | N.Pirgon Dökmeçi, teamleider <a href="mailto:pirgon-dokmeci@nwz.nl">pirgon-dokmeci@nwz.nl</a> tel:3590  |  |
| Wijzigingen t.o.v. vorige versie |   |  |