


## Gammahydroxyboterzuur (GHB) in serum

Synoniemen	vele	
Analysemethode	GC-FID (methode is gevalideerd)	
Uitgevoerd door	Intern	
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker.	
Aanvraagformulier	<a href="#">ziekenhuisapothek</a>	
Benodigd materiaal	4 ml stolbloed afgenomen in een buis zonder gel (rode dop)	
Afnametijd	binnen 6 uur na inname	
Afnametijd top-spiegel	n.v.t.	
Verzendconditie	geen bijzondere verzendcondities	
Bewaarconditie	bepalen binnen 24 uur, anders invriezen	
Monsterontvangst	Laboratorium van de ziekenhuisapothek	
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 1 dag Poliklinisch: maximaal 1 dag	
Referentiewaarde	0-1 mg/L : 25-75 mg/L : 50-150 mg/L : 150-250 mg/L : > 250 mg/L :	endogene concentraties concentraties na gebruik bij "house party's; euforie, verhoogd libido slaap, spontane bewegingen, af en toe openen ogen coma, reageert op pijnprikkels diep coma niet reagerend op pijnprikkels, ernstige ademhalingsdepressie
Bepalingsgrens	25 mg/L 350 mg/L	
CTG code	<a href="#">072811</a>	
Achtergrondinformatie	Zie toxicologie behandelinformatie NVZA: <a href="#">GHB</a>	
Contactpersoon	F. Ph Mulder, ziekenhuisapotheker QA/QC <a href="mailto:f.mulder@nwz.nl">f.mulder@nwz.nl</a> tel:7376 Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar. <a href="mailto:Apotheek-laboratorium@nwz.nl">Apotheek-laboratorium@nwz.nl</a> tel:3590	

Wijzigingen t.o.v. vorige versie

29-12-2020: Bepalingsgrens (350 mg/L) aangepast