


Gammahydroxyboterzuur (GHB) in urine

Synoniemen	vele
Analysemethode	GC-FID
Uitgevoerd door	Intern
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker.
Aanvraagformulier	ziekenhuisapotheek
Benodigd materiaal	5 ml urine afgenomen in een buis zonder boorzuur (gele dop) 
Afnametijd dal-spiegel	n.v.t.
Afnametijd top-spiegel	n.v.t.
Verzendconditie	geen bijzondere verzendcondities
Bewaarconditie	bepalen binnen 24 uur, anders invriezen
Monsterontvangst	n.v.t.
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 1 dag Poliklinisch: maximaal 1 dag
Resultaat	negatief / positief bij de aanvraag wordt standaard een kreatinine in urine bepaald om uit te sluiten dat de urine te verdund is voor analyse
CTG code	072811
Achtergrondinformatie	Zie toxicologie behandelinformatie NVZA: GHB
Contactpersoon	F. Ph Mulder, ziekenhuisapotheker QA/QC f.mulder@nwz.nl tel:7376 Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar. N.Pirgon Dökmeçi, teamleider pirgon-dokmeci@nwz.nl tel:3590

Wijzigingen t.o.v. vorige versie