


## Imatinib in plasma

Synoniemen	Glivec	
Analysemethode	LC-MS/MS (gevalideerde methode)	
Uitgevoerd door	Extern	
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: 1x per week, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker.	
Aanvraagformulier	<a href="#">ziekenhuisapotheek</a>	
Benodigd materiaal	10 ml gehepariniseerd bloed afgenomen in een buis zonder gel (groene dop) opsturen: plasma	
Afnametijd dal-spiegel	vlak (maximaal 30 minuten) voor toediening. De spiegel afnemen is pas zinvol als steady-state bereikt is, ca. 4 dagen na start van de therapie of dosisaanpassing.	
Afnametijd top-spiegel	n.v.t.	
Verzendconditie	bevroren -20°C (verzending op droogijs)	
Bewaarconditie	plasma invriezen	
Monsterontvangst	Laboratorium van de ziekenhuisapotheek	
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 21 dagen Poliklinisch: maximaal 21 dagen	
Referentiewaarden	Dal:	> 1000 mcg/L
	Top:	-
	Toxisch vanaf:	-
Bepalingsgrens		
CTG code	<a href="#">072890</a>	
Achtergrondinformatie	Zie TDM monografie NVZA: <a href="#">Imatinib</a>	
Contactpersoon	F. Ph Mulder, ziekenhuisapotheker QA/QC <a href="mailto:f.mulder@nwz.nl">f.mulder@nwz.nl</a> tel:7376 Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar.	
	Klinisch Farmaceutisch Laboratorium Tel: 072-548 3590	

### Wijzigingen t.o.v. vorige versie

08-11-2021 PB:

verzendconditie aangepast naar informatie extern laboratorium

hyperlinks hersteld