


Khat in urine

Synoniemen	-	
Analysemethode	LC	
Uitgevoerd door	Extern	
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: 1x per week, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker.	
Aanvraagformulier	ziekenhuisapothek	
Benodigd materiaal	5 ml urine afgenomen in een buis zonder boorzuur (gele dop)	
Afnametijd dal-spiegel	n.v.t.	
Afnametijd top-spiegel	n.v.t.	
Verzendconditie	geen bijzondere verzendcondities	
Bewaarconditie	bepalen binnen 24 uur, anders invriezen	
Monsterontvangst	Laboratorium van de ziekenhuisapothek	
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 14 dagen Poliklinisch: maximaal 14 dagen	
Resultaat	negatief / positief bij de aanvraag wordt standaard een kreatinine in urine bepaald om uit te sluiten dat de urine te verdund is voor analyse	
CTG code	072811	
Achtergrondinformatie		
Contactpersoon	F. Ph Mulder, ziekenhuisapotheker QA/QC f.mulder@nwz.nl tel:7376 Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar.	
	N.Pirgon Dökmeçi, teamleider pirgon-dokmeci@nwz.nl tel:3590	
Wijzigingen t.o.v. vorige versie		