


## Laxantia-screening in urine

|                        |  |  |
|------------------------|--|--|
| Synoniemen             | -  |  |
| Analysemethode         | LC-MS/MS   |  |
| Uitgevoerd door        | Extern   |  |
| Bepalingsfrequentie    | CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker<br>Normaal: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker.   |  |
| Aanvraagformulier      | <a href="#">ziekenhuisapotheek</a>   |  |
| Benodigd materiaal     | 10 ml urine afgenomen in een buis zonder boorzuur (gele dop)   |  |
| Afnametijd             | 3 dagen achtereen een portie urine   |  |
| Afnametijd top-spiegel | n.v.t.   |  |
| Verzendconditie        | geen bijzondere verzendcondities   |  |
| Bewaarconditie         | geen bijzondere bewaarcondities  |  |
| Monsterontvangst       | Laboratorium van de ziekenhuisapotheek   |  |
| Doorlooptijd           | Klinisch: maximaal 31 dagen<br>Poliklinisch: maximaal 31 dagen   |  |
| Resultaat              | er wordt gescreend op: aloe-emodin, bisacodyl, chrysofaanzuur, dantron, emodin, fenolftaleïne en rhein<br>het resultaat is aantoonbaar / niet aantoonbaar<br>bij de aanvraag wordt standaard een kreatinine in urine bepaald om uit te sluiten dat de urine te verdund is voor analyse |  |
| CTG code               | <a href="#">072815</a>   |  |
| Achtergrondinformatie  |  |  |
| Contactpersoon         | F. Ph Mulder, ziekenhuisapotheker QA/QC <a href="mailto:f.mulder@nwz.nl">f.mulder@nwz.nl</a> tel:7376<br>Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar.<br>Klinisch Farmaceutisch Laboratorium <a href="tel:0880853590">tel: 088 085 3590</a>                             |  |

### Wijzigingen t.o.v. vorige versie

26-07-2023: uitvoerend extern laboratorium gewijzigd, waardoor de analysemethode, het aantal te bepalen componenten en de doorlooptijd is gewijzigd.