

Laxantia-screening in urine

Synoniemen	-	
Analysemethode	GC-MS	
Uitgevoerd door	Extern	
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker.	
Aanvraagformulier	ziekenhuisapotheek	
Benodigd materiaal	10 ml urine afgenomen in een buis zonder boorzuur (gele dop)	
Afnametijd	3 dagen achtereenvolgend een portie urine	
Afnametijd top-spiegel	n.v.t.	
Verzendconditie	geen bijzondere verzendcondities	
Bewaarconditie	geen bijzondere bewaarcondities	
Monsterontvangst	Laboratorium van de ziekenhuisapotheek	
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 14 dagen Poliklinisch: maximaal 14 dagen	
Resultaat	er wordt gescreend op: bisacodyl, chrysofaanzuur, dantron en fenolftaleïne het resultaat is aantoonbaar / niet aantoonbaar bij de aanvraag wordt standaard een kreatinine in urine bepaald om uit te sluiten dat de urine te verdund is voor analyse	
CTG code	072815	
Achtergrondinformatie		
Contactpersoon	F. Ph Mulder, ziekenhuisapotheker QA/QC f.mulder@nwz.nl tel:7376 Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar. N.Pirgon Dökmeci, teamleider pirgon-dokmeci@nwz.nl tel:3590	
Wijzigingen t.o.v. vorige versie		