


Levetiracetam in serum

Synoniemen	Kepra, Matever	
Analysemethode	LC-MS/MS (methode is gevalideerd)	
Uitgevoerd door	Intern	
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: 1x per week op dinsdag, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker. Materiaal dient op de bepalingdag voor 08:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn.	
Aanvraagformulier	ziekenhuisapotheek	
Benodigd materiaal	4 ml stolbloed afgenomen in een buis zonder gel (rode dop)	
Afnametijd dal-spiegel	vlak (maximaal 30 minuten) voor toediening	
Afnametijd top-spiegel	n.v.t.	
Verzendconditie	geen bijzondere verzendcondities	
Bewaarconditie	geen bijzondere bewaarcondities	
Monsterontvangst	Laboratorium van de ziekenhuisapotheek	
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 14 dagen Poliklinisch: maximaal 14 dagen	
Referentiewaarden	Dal:	5,0 – 25,0 mg/L
	Top:	-
	Toxisch vanaf	80,0 mg/L
Bepalingsgrens	1,0 mg/L	
	50,0 mg/L	
CTG code	072841	
Achtergrondinformatie	Zie TDM monografie NVZA: Levetiracetam	
Contactpersoon	F. Ph Mulder, ziekenhuisapotheker QA/QC f.mulder@nwz.nl tel:7376 Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar.	
	N.Pirgon Dökmeçi, teamleider pirgon-dokmeci@nwz.nl tel:3590	

Wijzigingen t.o.v. vorige versie

20-03-2018 PB:
bepalingsdag toegevoegd;
hyperlink naar de Nederlandse Zorgautoriteit aangepast