

## Levomepromazine in serum

Synoniemen	Nozinan	
Analysemethode	LS-MS/MS (gevalideerde methode)	
Uitgevoerd door	Intern	
Kwaliteitssysteem geïmplementeerd	Nee Alleen voor Toxicologie	
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker.	
Aanvraagformulier	<a href="#">ziekenhuisapotheek</a>	
Benodigd materiaal	4 ml stolbloed afgenomen in een buis zonder gel (rode dop)	
Afnametijd dal-spiegel	n.v.t.	
Afnametijd top-spiegel	n.v.t.	
Verzendconditie	geen bijzondere verzendcondities	
Bewaarconditie	geen bijzondere bewaarcondities	
Monsterontvangst	Laboratorium van de ziekenhuisapotheek	
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 14 dagen Poliklinisch: maximaal 14 dagen	
Referentiewaarden	dal	30-150 mcg/L
	Top:	-
	Toxisch vanaf	> 500 mcg/L
Bepalingsgrens	Levomepromazine 12 - 280 mcg/L	
CTG code	<a href="#">072884</a>	
Achtergrondinformatie	Zie toxicologie behandelinformatie NVZA: <a href="#">Levomepromazine</a>	
Contactpersoon	F.Ph. Mulder, ziekenhuisapotheker QA/QC <a href="mailto:f.mulder@nwz.nl">f.mulder@nwz.nl</a> tel:7376 Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar.	
	<a href="mailto:apotheek-laboratorium@nwz.nl">apotheek-laboratorium@nwz.nl</a> tel:3590	

### Wijzigingen t.o.v. vorige versie

02-01-2023 NP: bepaling wordt intern uitgevoerd, bepalingsgrens aangepast. Kwaliteitssysteem toegevoegd. Contactgegevens geactualiseerd.