


## Midazolam in serum

Synoniemen	Dormicum	
Analysemethode	LC-MS/MS (gevalideerde methode)	
Uitgevoerd door	Extern	
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker.	
Aanvraagformulier	<a href="#">ziekenhuisapotheek</a>	
Benodigd materiaal	4 ml EDTA bloed afgenomen in een buis zonder gel (paarse dop) . plasma opsturen	
Afnametijd dal-spiegel	vlak (maximaal 30 minuten) voor toediening of minimaal 12 uur na laatste toediening (van toepassing bij gift in de avond)	
Afnametijd top-spiegel	n.v.t.	
Verzendconditie	geen bijzondere verzendcondities	
Bewaarconditie	geen bijzondere bewaarcondities	
Monsterontvangst	Laboratorium van de ziekenhuisapotheek	
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 1 dag Poliklinisch: maximaal 14 dagen	
Referentiewaarden	Dal:	midazolam: 100 – 1000 mcg/L alfa-hydroxy-midazolam: 30 – 180 mcg/L alfa-hydroxy-midazolam-glucuronide: onbekend
	Top:	-
	Toxisch vanaf	midazolam: 1500 – 2500 mcg/L alfa-hydroxy-midazolam: onbekend alfa-hydroxy-midazolam-glucuronide: onbekend
Bepalingsgrens		
CTG code	<a href="#">072805</a>	
Achtergrondinformatie	Zie Toxicologie behandelinformatie NVZA: <a href="#">Benzodiazepinen</a> Zie TDM monografie NVZA: <a href="#">Midazolam</a>	
Contactpersoon	F. Ph Mulder, ziekenhuisapotheker QA/QC <a href="mailto:f.mulder@nwz.nl">f.mulder@nwz.nl</a> tel:7376 Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar.	
	N.Pirgon Dökmeçi, teamleider <a href="mailto:pirgon-dokmeci@nwz.nl">pirgon-dokmeci@nwz.nl</a> tel:3590	
Wijzigingen t.o.v. vorige versie		