


Nelfinavir in plasma

Synoniemen	Viracept	
Analysemethode	LC-MS	
Uitgevoerd door	Extern	
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: 1x per twee weken, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker.	
Aanvraagformulier	ziekenhuisapothek	
Benodigd materiaal	4 ml EDTA bloed afgenomen in een buis zonder gel (paarse dop) opsturen: plasma	
Afnametijd dal-spiegel	n.v.t.	
Afnametijd top-spiegel	n.v.t.	
Verzendconditie	geen bijzondere verzendcondities	
Bewaarconditie	geen bijzondere bewaarcondities	
Monsterontvangst	Laboratorium van de ziekenhuisapothek	
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 28 dagen Poliklinisch: maximaal 28 dagen	
Referentiewaarden		CR (concentratie ratio) t.o.v. vorige controle moet > 0,9 zijn
	Top:	
	Toxisch vanaf:	
Bepalingsgrens		
CTG code	072894	
Achtergrondinformatie	Zie informatie UMC Radboud: Nelfinavir	
Contactpersoon	F. Ph Mulder, ziekenhuisapotheker QA/QC f.mulder@nwz.nl tel:7376 Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar.	
	N.Pirgon Dökmeçi, teamleider pirgon-dokmeci@nwz.nl tel:3590	
Wijzigingen t.o.v. vorige versie		