


## Nevirapine in plasma

Synoniemen	Viramune	
Analysemethode	LC-MS	
Uitgevoerd door	Extern	
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: 1x per twee weken, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker.	
Aanvraagformulier	<a href="#">ziekenhuisapothek</a>	
Benodigd materiaal	4 ml EDTA bloed afgenomen in een buis zonder gel (paarse dop) opsturen: plasma	
Afnametijd dal-spiegel	vlak (maximaal 30 minuten) voor toediening	
Afnametijd top-spiegel	n.v.t.	
Verzendconditie	geen bijzondere verzendcondities	
Bewaarconditie	geen bijzondere bewaarcondities	
Monsterontvangst	Laboratorium van de ziekenhuisapothek	
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 28 dagen Poliklinisch: maximaal 28 dagen	
Referentiewaarden	Dal:	3 – 8 mg/L
	Top:	
	Toxisch vanaf:	8 mg/L
Bepalingsgrens		
CTG code	<a href="#">072894</a>	
Achtergrondinformatie	Zie informatie UMC Radboud: <a href="#">Nevirapine</a>	
Contactpersoon	F. Ph Mulder, ziekenhuisapotheker QA/QC <a href="mailto:f.mulder@nwz.nl">f.mulder@nwz.nl</a> tel:7376 Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar.	
	N.Pirgon Dökmeçi, teamleider <a href="mailto:pirgon-dokmeci@nwz.nl">pirgon-dokmeci@nwz.nl</a> tel:3590	
Wijzigingen t.o.v. vorige versie		