


## Olanzapine in serum

Synoniemen	Zyprexa, Zypadhere	
Analysemethode	LS-MS/MS (gevalideerde methode)	
Uitgevoerd door	Intern	
Kwaliteitssysteem geïmplementeerd	ISO 15189 (M075), KF.TDM.02	
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: 1x per 10 dagen, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker.	
Aanvraagformulier	<a href="#">ziekenhuisapotheek</a>	
Benodigd materiaal	4 ml stolbloed afgenomen in een buis zonder gel (rode dop)	
Afnametijd dal-spiegel	vlak (maximaal 30 minuten) voor toediening	
Afnametijd top-spiegel	n.v.t.	
Verzendconditie	serum gekoeld verzenden	
Bewaarconditie	serum gekoeld bewaren	
Monsterontvangst	Laboratorium van de ziekenhuisapotheek	
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 14 dagen Poliklinisch: maximaal 14 dagen	
Referentiewaarden		Olanzapine: 20 – 80 mcg/L Desmethylolanzapine : -
	Top:	-
	Toxisch vanaf	100 mcg/L
Bepalingsgrens	Olanzapine 5 mcg/L Desmethylolanzapine 7 mcg/L	
	Olanzapine 150 mcg/L Desmethylolanzapine 150 mcg/L	
CTG code	<a href="#">072884</a>	
Achtergrondinformatie	Zie TDM monografie NVZA: <a href="#">Olanzapine</a>	
Contactpersoon	F. Ph Mulder, ziekenhuisapotheker QA/QC <a href="mailto:f.mulder@nwz.nl">f.mulder@nwz.nl</a> tel:7376 Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar.	
	<a href="mailto:apotheek-laboratorium@nwz.nl">apotheek-laboratorium@nwz.nl</a> tel:3590	

### Wijzigingen t.o.v. vorige versie

02-01-2023 NP: bepaling wordt intern uitgevoerd, referentiewaarden, bepalingsgrens en bepalingfrequentie aangepast. Kwaliteitssysteem toegevoegd. Contactgegevens geactualiseerd.