


## Paliperidon in serum

Synoniemen	9-hydroxy-risperidon Paliperidon of 9-hydroxy-risperidon is de actieve metaboliet van risperidon	
Analysemethode	LS-MS/MS (gevalideerde methode)	
Uitgevoerd door	Intern	
Kwaliteitssysteem geïmplementeerd	ISO 15189 (M075), KF.TDM.02	
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: 1x per 10 dagen, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker.	
Aanvraagformulier	<a href="#">ziekenhuisapothek</a>	
Benodigd materiaal	4 ml stolbloed afgenomen in een buis zonder gel (rode dop)	
Afnametijd dal-spiegel	n.v.t.	
Afnametijd top-spiegel	n.v.t.	
Verzendconditie	geen bijzondere verzendcondities	
Bewaarconditie	geen bijzondere bewaarcondities	
Monsterontvangst	Laboratorium van de ziekenhuisapothek	
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 14 dagen Poliklinisch: maximaal 14 dagen	
Referentiewaarden	dal	12-60 mcg/L
	Top:	-
	Toxisch vanaf	120 mcg/L
Bepalingsgrens	5 mcg/L	
	140 mcg/L	
CTG code		
Achtergrondinformatie	Zie TDM monografie NVZA: <a href="#">Risperidon</a>	
Contactpersoon	F. Ph Mulder, ziekenhuisapotheker QA/QC <a href="mailto:f.mulder@nwz.nl">f.mulder@nwz.nl</a> tel:7376 Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar.	
	<a href="mailto:apothek-laboratorium@nwz.nl">apothek-laboratorium@nwz.nl</a> tel:3590	

Wijzigingen t.o.v. vorige versie