


Paracetamol in serum

Synoniemen	vele	
Analysemethode	Immunoassay (methode is gevalideerd)	
Uitgevoerd door	Intern	
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: dagelijks, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker.	
Aanvraagformulier	ziekenhuisapotheek	
Benodigd materiaal	4 ml stolbloed afgenomen in een buis zonder gel (rode dop)	
Afnametijd	4 uur en 8 uur na vermoedelijke inname	
Afnametijd	n.v.t.	
Verzendconditie	geen bijzondere verzendcondities	
Bewaarconditie	geen bijzondere bewaarcondities	
Monsterontvangst	KCHI locatie Noord CITO-lab	
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 1 dag Poliklinisch: maximaal 7 dagen	
Referentiewaarden		≤ 20 mg/L
	Toxisch vanaf	150 mg/L (4 uurs spiegel)
Bepalingsgrens	7 mg/L	
	300 mg/L	
CTG code	072845	
Achtergrondinformatie	Zie toxicologie behandelinformatie NVZA: Paracetamol	
Contactpersoon	F. Ph Mulder, ziekenhuisapotheker QA/QC f.mulder@nwz.nl tel:7376 Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar.	
	J. Meijer teamleider citolab (KCHI) J.Meijer@nwz.nl tel:3540	
Wijzigingen t.o.v. vorige versie		
20-07-2020: meetbereik aangepast n.a.v. nieuwe apparatuur		