


Paraquat in serum

Synoniemen	methylviologen	
Analysemethode	spectrofotometrie	
Uitgevoerd door	Extern	
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker.	
Aanvraagformulier	ziekenhuisapotheek	
Benodigd materiaal	4 ml stolbloed afgenomen in een buis zonder gel (rode dop)	
Afnametijd dal:	n.v.t.	
Afnametijd	n.v.t.	
Verzendconditie	gekoeld versturen	
Bewaarconditie	gekoeld bewaren	
Monsterontvangst	Laboratorium van de ziekenhuisapotheek	
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 1 dag Poliklinisch: maximaal 1 dag	
Referentiewaarden	Toxisch	vanaf 0,6 mg/L (6 uur na inname) bron: toxicologie.org; geraadpleegd d.d. 15-12-2020
Bepalingsgrens	0,5 mg/L	
	5 mg/L	
CTG code	072899, voorheen 072906	
Achtergrondinformatie	Zie toxicologie behandelinformatie NVZA: Paraquat en diquat	
Contactpersoon	F. Ph Mulder, ziekenhuisapotheker QA/QC f.mulder@nwz.nl tel:7376 Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar.	
	apotheek-laboratorium@nwz.nl tel:3590	

Wijzigingen t.o.v. vorige versie

21-12-2020: bepaling wordt extern bepaald; diquat verwijderd; hyperlinks hersteld