


## Sertraline in serum

Synoniemen	Zoloft	
Analysemethode	LC-MS/MS (methode is gevalideerd)	
Uitgevoerd door	Extern	
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: 1x per twee weken, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker.	
Aanvraagformulier	<a href="#">ziekenhuisapotheek</a>	
Benodigd materiaal	4 ml stolbloed afgenomen in een buis zonder gel (rode dop)	
Afnametijd dal-spiegel	vlak (maximaal 30 minuten) voor toediening of minimaal 12 uur na laatste toediening (van toepassing bij gift in de avond)	
Afnametijd top-spiegel	n.v.t.	
Verzendconditie	geen bijzondere verzendcondities	
Bewaarconditie	geen bijzondere bewaarcondities	
Monsterontvangst	Laboratorium van de ziekenhuisapotheek	
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 14 dagen Poliklinisch: maximaal 14 dagen	
Referentiewaarden	Dal:	sertraline: 10 – 150 mcg/L desmethylsertraline: 1,5 – 2x hoger dan sertraline
	Top:	-
	Toxisch vanaf	300 mcg/L
Bepalingsgrens	sertraline: 5 mcg/L desmethylsertraline: 10 mcg/L sertrealine: 250 mcg/L desmethylsertraline: 400 mcg/L	
CTG code	<a href="#">72809</a>	
Achtergrondinformatie	Zie TDM monografie NVZA: <a href="#">SSRI</a> AGNP Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Psychiatry: Update 2011	
Contactpersoon	F.Ph. Mulder, ziekenhuisapotheker QA/QC <a href="mailto:f.mulder@nwz.nl">f.mulder@nwz.nl</a> tel:7376 Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar.	
	N. Pirgon Dökmeci, teamleider <a href="mailto:pirgon-dokmeci@nwz.nl">pirgon-dokmeci@nwz.nl</a> tel:3590	
Wijzigingen t.o.v. vorige versie		