


Sirolimus in bloed

Synoniemen	Rapamune	
Analysemethode	LC-MS/MS (methode is gevalideerd)	
Uitgevoerd door	Intern	
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: 1x per week op dinsdag, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker. Materiaal dient op de bepalingdag voor 08:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn.	
Aanvraagformulier	ziekenhuisapothek	
Benodigd materiaal	4 ml EDTA bloed afgenomen in een buis zonder gel (paarse dop)	
Afnametijd dal-spiegel	vlak (maximaal 30 minuten) voor toediening	
Afnametijd top-spiegel	n.v.t.	
Verzendconditie	geen bijzondere verzendcondities	
Bewaarconditie	geen bijzondere bewaarcondities	
Monsterontvangst	Laboratorium van de ziekenhuisapothek	
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 7 dagen Poliklinisch: maximaal 14 dagen	
Referentiewaarden	Dal:	4 - 12
	Top:	-
	Toxisch vanaf	-
Bepalingsgrens	1,5 mcg/L	
	50 mcg/L	
CTG code	072866	
Achtergrondinformatie	Zie TDM monografie NVZA: Sirolimus	
Contactpersoon	F. Ph Mulder, ziekenhuisapotheker QA/QC f.mulder@nwz.nl tel:7376 Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar.	
	Laboratorium: apothek-laboratorium@nwz.nl - tel:3590	

Wijzigingen t.o.v. vorige versie

14-03-2022 NP:
Bepaling wordt intern uitgevoerd
Doorlooptijd klinisch is aangepast