


## Sulfamethoxazol in serum

Synoniemen	Bactrimel, Co-trimoxazol (combinatiepreparaat met trimethoprim)	
Analysemethode	LC-MS/MS (methode is gevalideerd)	
Uitgevoerd door	Extern	
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: 1x per week, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker.	
Aanvraagformulier	<a href="#">ziekenhuisapotheek</a>	
Benodigd materiaal	4 ml stolbloed afgenomen in een buis zonder gel (rode dop)	
Afnametijd dal-spiegel	n.v.t.	
Afnametijd top-spiegel	n.v.t.	
Verzendconditie	geen bijzondere verzendcondities	
Bewaarconditie	geen bijzondere bewaarcondities	
Monsterontvangst	Laboratorium van de ziekenhuisapotheek	
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 2 dagen Poliklinisch: maximaal 2 dagen	
Referentiewaarden		sulfamethoxazol: 50 – 150 mg/L acetylsulfamethoxazol < 50 mg/L
	Toxisch vanaf	sulfamethoxazol: 200 mg/L acetylsulfamethoxazol: 75 mg/L
Bepalingsgrens	sulfamethoxazol: 5 mg/L acetylsulfamethoxazol: 5 mg/L	
	sulfamethoxazol: 100 mg/L acetylsulfamethoxazol: 100 mg/L	
CTG code	<a href="#">072894</a>	
Achtergrondinformatie		
Contactpersoon	F. Ph Mulder, ziekenhuisapotheker QA/QC <a href="mailto:f.mulder@nwz.nl">f.mulder@nwz.nl</a> tel:7376 Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar.	
	N.Pirgon Dökmeci, teamleider <a href="mailto:pirgon-dokmeci@nwz.nl">pirgon-dokmeci@nwz.nl</a> tel:3590	
Wijzigingen t.o.v. vorige versie		