


## Temazepam in serum

Synoniemen	Normison	
Analysemethode	LC-MS/MS (gevalideerde methode)	
Uitgevoerd door	Extern	
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: 1x per twee weken, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker.	
Aanvraagformulier	<a href="#">ziekenhuisapothek</a>	
Benodigd materiaal	4 ml stolbloed afgenomen in een buis zonder gel (rode dop)	
Afnametijd dal-spiegel	n.v.t.	
Afnametijd top-spiegel	n.v.t.	
Verzendconditie	geen bijzondere verzendcondities	
Bewaarconditie	geen bijzondere bewaarcondities	
Monsterontvangst	Laboratorium van de ziekenhuisapothek	
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 14 dagen Poliklinisch: maximaal 14 dagen	
Referentiewaarden	Dal:	temazepam: 20 – 100 mcg/L oxazepam: 1000 – 2000 mcg/L
	Top:	temazepam: 300 – 800 mcg/L
	Toxisch vanaf	temazepam: 1000 mcg/L oxazepam: 3000 mcg/L
Bepalingsgrens	temazepam: 20 mcg/L oxazepam: 40 mcg/L	
	temazepam: 2200 mcg/L oxazepam: 4400 mcg/L	
CTG code	<a href="#">072805</a>	
Achtergrondinformatie	Zie Toxicologie behandelinformatie NVZA: <a href="#">Benzodiazepinen</a>	
Contactpersoon	F. Ph Mulder, ziekenhuisapotheker QA/QC <a href="mailto:f.mulder@nwz.nl">f.mulder@nwz.nl</a> tel:7376 Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar.	
	N.Pirgon Dökmeçi, teamleider <a href="mailto:pirgon-dokmeci@nwz.nl">pirgon-dokmeci@nwz.nl</a> tel:3590	
Wijzigingen t.o.v. vorige versie		