


Thiocyanaat in serum

Synoniemen	-	
Analysemethode	spectrofotometrie (methode is gevalideerd)	
Uitgevoerd door	Intern	
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker.	
Aanvraagformulier	ziekenhuisapotheek	
Benodigd materiaal	4 ml stolbloed afgenomen in een buis zonder gel (rode dop)	
Afnametijd dal:	vlak (maximaal 30 minuten) voor toediening	
Afnametijd	n.v.t.	
Verzendconditie	geen bijzondere verzendcondities	
Bewaarconditie	geen bijzondere bewaarcondities	
Monsterontvangst	Laboratorium van de ziekenhuisapotheek	
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 1 dag Poliklinisch: maximaal 7 dagen	
Referentiewaarden	Dal:	niet rokers: 1 – 4 mg/L rokers: 3 – 12 mg/L nitroprusside infusie: 6 – 30 mg/L
	Toxisch vanaf	niet rokers: 35- 50 mg/L nitroprusside infusie: 60 mg/L
Bepalingsgrens	10 mg/L 80 mg/L	
CTG code	075886	
Achtergrondinformatie	Zie toxicologie behandelinformatie NVZA: Cyaanverbindingen	
Contactpersoon	F. Ph Mulder, ziekenhuisapotheker QA/QC f.mulder@nwz.nl tel:7376 Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar.	
	N.Pirgon Dökmeci, teamleider pirgon-dokmeci@nwz.nl tel:3590	
Wijzigingen t.o.v. vorige versie		