


Verapamil in serum

Synoniemen	Isoptin	
Analysemethode	LC-MS/MS (gevalideerde methode)	
Uitgevoerd door	Extern	
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: 2x per week, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker.	
Aanvraagformulier	ziekenhuisapotheek	
Benodigd materiaal	4 ml stolbloed afgenomen in een buis zonder gel (rode dop)	
Afnametijd dal-spiegel	-	
Afnametijd top-spiegel	-	
Verzendconditie	geen bijzondere verzendcondities	
Bewaarconditie	geen bijzondere bewaarcondities	
Monsterontvangst	Laboratorium van de ziekenhuisapotheek	
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 14 dagen Poliklinisch: maximaal 14 dagen	
Referentiewaarden		somspiegel verapamil + norverapamil: 150 – 750 mcg/L
	Toxisch vanaf	somspiegel verapamil + norverapamil: 1000 mcg/L
Bepalingsgrens	verapamil: 20 mcg/L norverapamil: 20 mcg/L	
	verapamil: 2300 mcg/L norverapamil: 2000 mcg/L	
CTG code	072886	
Achtergrondinformatie	zie toxicologie behandelinformatie NVZA: Calciumantagonisten	
Contactpersoon	F. Ph Mulder, ziekenhuisapotheker QA/QC f.mulder@nwz.nl tel:7376 Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar.	
	N.Pirgon Dökmeçi, teamleider pirgon-dokmeci@nwz.nl tel:3590	
Wijzigingen t.o.v. vorige versie		