


Voriconazol in serum

Synoniemen	VFend	
Analysemethode	LC-MS/MS (methode is gevalideerd)	
Uitgevoerd door	Extern	
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: 3x per week, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker.	
Aanvraagformulier	ziekenhuisapotheek	
Benodigd materiaal	4 ml stolbloed afgenomen in een buis zonder gel (rode dop)	
Afnametijd dal-spiegel	vlak (maximaal 30 minuten) voor toediening.	
Afnametijd top-spiegel	n.v.t.	
Verzendconditie	gekoeld versturen	
Bewaarconditie	gekoeld bewaren	
Monsterontvangst	Laboratorium van de ziekenhuisapotheek	
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 2 dagen Poliklinisch: maximaal 2 dagen	
Referentiewaarden	Dal:	
	Algemeen	1,5 – 5,5 mg/L
	Pulm. Aspergill.	1-6 mg/L
	Leverfunctiest.	bovengrens verlagen naar 4 mg/L
	Moeilijk penetraabel gebied (cerebraal, sinus)	2-6 mg/L
	Toxisch vanaf	5,5 mg/L
Bepalingsgrens	0,1 mg/L	
	10 mg/L	
CTG code	072894	
Achtergrondinformatie	Zie TDM monografie NVZA: Voriconazol	
Contactpersoon	F. Ph Mulder, ziekenhuisapotheker QA/QC f.mulder@nwz.nl tel:7376 Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar.	
	N.Pirgon Dökmeci, teamleider pirgon-dokmeci@nwz.nl tel:3590	

Wijzigingen t.o.v. vorige versie

Ref.waarden bij leverfunctiestoornissen (NVZA) en ref.waarden bij moeilijk penetraabel gebied (NVZA) en ref. waarden specifiek voor behandeling pulmonale aspergillose (NVZA) toegevoegd.
Daarvoor TDM monografie NVZA geraadpleegd op 07-05-2019
Ref.waarden algemeen, bron: UMCG Bepalingswijzer, geraadpleegd 07-05-2019