

Endocarditis

Infectie van de binnenbekleding
van het hart

www.nwz.nl



Noordwest
Ziekenhuisgroep

Inhoud

Wat is endocarditis?	3
Het hart: hoe werkt het?	3
Welke klachten horen bij endocarditis?	4
Wat zijn de gevolgen van endocarditis?	5
Uw opname	7
Welke onderzoeken krijgt u?	7
De behandeling	10
Leefregels	13
Hartrevalidatie na ontslag	14
Tandarts	15
Uw vragen	15

U bent op de verpleegafdeling cardiologie opgenomen, omdat u (mogelijk) een infectie heeft aan de binnenbekleding van het hart. Dit noemen we endocarditis. In deze folder geven we u informatie over het ziektebeeld, de onderzoeken en de behandeling in het ziekenhuis en enkele leefregels voor thuis. Tijdens uw opname krijgt u natuurlijk ook mondeling informatie van uw arts en de verpleegkundige. Het is goed om te beseffen dat uw persoonlijke situatie anders kan zijn dan in deze folder is beschreven.

■ **Wat is endocarditis?**

Endocarditis is een infectie van de binnenbekleding van het hart (endocard genoemd), bloed- en lymfevaten en/of hartkleppen. De infectie wordt meestal veroorzaakt door een bacterie die via de bloedbaan in het hart terechtkomt. Als de bacteriën zich nestelen op de binnenbekleding van hart, lymfevaten of kleppen, ontstaat een ontsteking.

De bacteriën kunnen in de bloedbaan terechtkomen door:

- verwonding/ontsteking van huid, mondslijmvlies of tandvlees
- huidinfecties
- medische ingrepen (bijvoorbeeld bij vervanging van een hartklep of plaatsing van een prothese, bijv. een knieprothese)


De bacteriën die bacteriële endocarditis veroorzaken, horen bij het lichaam. Iedereen draagt ze bij zich. Kleine hoeveelheden bacteriën maakt het lichaam meestal meteen onschadelijk. Bij patiënten met een verminderde weerstand hebben de bacteriën meer kans om te overleven. Ze krijgen dan de kans om op de binnenbekleding van het hart en de kleppen te gaan zitten, waardoor endocarditis kan optreden. Endocarditis komt voor bij jong en oud.

■ **Het hart: hoe werkt het?**

Het hart is de belangrijkste spier van ons lichaam. Het pompt het bloed rond en zorgt er zo voor dat ons lichaam goed kan functioneren. Het hart bestaat uit 4 ruimtes - 2 kamers en 2 boezems - en heeft 4 kleppen. Deze kleppen zorgen ervoor dat het hart het bloed in de goede richting pompt. Door endocarditis

kunnen de kleppen ernstig beschadigd raken. In onderstaande afbeelding zijn de kleppen weergegeven:

- pulmonalisklep
- tricuspidalisklep
- aortaklep
- mitralisklep



■ Welke klachten horen bij endocarditis?

Endocarditis is in de meeste gevallen een acute aandoening: het treedt plotseling op. Ook komt het in een subacute vorm voor: dan ontstaat het geleidelijk.

Subacute endocarditis

Bij subacute endocarditis kunt u maandenlang onduidelijke klachten hebben. Deze nemen langzaam toe. Subacute endocarditis is een gevaarlijke aandoening. De meest voorkomende symptomen zijn:

- lichte verhoging (37,5 - 38,5 graden)
- vermoeidheid
- zweten
- gewichtsverlies
- bloedarmoede
- hartgeruis

Overige klachten zijn:

- gewrichtspijn
- koude rillingen
- bleke huidskleur
- vlekjes op de huid, in het oogwit of onder de vingernagels
- buikpijnlachten door opgezette milt
- verwardheid

Acute bacteriële endocarditis

Acute bacteriële endocarditis ontstaat vaak plotseling. Het kan binnen enkele dagen levensbedreigend worden. Klachten zijn:

- hoge koorts (39 - 40 graden)
- versnelde hartslag
- vermoeidheid

Als door de infectie een hartklep wordt beschadigd, kunnen verschijnselen van hartfalen optreden, zoals kortademigheid en het vasthouden van vocht. De diagnose is niet altijd gemakkelijk te stellen, omdat de symptomen lijken op griep. Daarom kijken we naar afwijkingen in het bloed, de aanwezigheid van bacteriën in het bloed en afwijkingen van het hart.

■ Wat zijn de gevolgen van endocarditis?

Endocarditis kan verschillende gevolgen hebben, zoals:

- stolselvorming
- beschadiging van de hartkleppen (klepinsufficiëntie)
- hartritmestoornissen
- bloedvergiftiging
- overlijden

Stolselvorming

Als de binnenbekleding van het hart beschadigd is, kunnen stolsels worden gevormd. Bacteriën nestelen zich op de beschadigde binnenbekleding en vermenigvuldigen zich, waardoor een zogenoemde ‘vegetatie’ kan ontstaan. Dit is een ophoping van bloedplaatjes, stolsels, witte bloedlichaampjes en bacteriën.

Als deze ophopingen loslaten en door de bloedbaan gaan circuleren, spreken we van embolieën. Door embolieën kunnen afwijkingen ontstaan, zoals een herseninfarct.

Klepinsufficiëntie

Endocarditis kan de kleppen van het hart beschadigen. We noemen dat klepin-sufficiëntie. Het houdt in dat de klep niet goed kan sluiten, waardoor er lekkage ontstaat. Als bijvoorbeeld de aortaklep niet goed meer sluit, stroomt er bloed terug in de linkerkamer van het hart. Daardoor moet het hart harder werken om het bloed rond te pompen in het lichaam. Hierdoor kunt u vocht vasthouden. Dit noemen we hartfalen. Als u klepinsufficiëntie en hierdoor mogelijk hartfalen heeft, kan dit invloed hebben op uw levenswijze. Er zijn in dit geval bepaalde leefregels opgesteld. U krijgt onder andere een vochtbeperking van maximaal 1500 ml en een zoutarm dieet. Daarnaast wordt u dagelijks gewogen. Vraag uw verpleegkundige naar meer informatie over hartfalen of bekijk de folder ‘hartfa-len’. U vindt deze folder op www.nwz.nl/patientenfolders.

Ritmestoornissen

Er kunnen verschillende hartritmestoornissen voorkomen. Vandaar dat u moge-lijk (een aantal dagen/weken) aan een telemetriekastje wordt gekoppeld en er regelmatig een hartfilmpje (ECG) wordt gemaakt. Meer informatie over teleme-trie vindt u verderop in deze folder.

Bloedvergiftiging (sepsis)

Door de infectie bestaat de kans dat uw bloed zichzelf vergiftigt. Dit kan levens-bedreigend zijn. Vandaar dat we met regelmaat bloed afnemen om de ontste-kingswaarden te controleren. Ook als er koorts optreedt (boven 38,5 graad), wordt bloed afgenomen en onderzocht.

Overlijden

Ondanks de uitstekende therapieën en technieken van vandaag de dag is er altijd een kans op overlijden.

■ Uw opname

Mensen met endocarditis worden opgenomen op de verpleegafdeling cardiologie (afdeling B4). Gemiddeld duurt dit 6 weken. Soms kan de opname verkort worden en kan de behandeling thuis plaatsvinden. Hierover leest u meer in de kop 'de behandeling'.

■ Welke onderzoeken krijgt u?

Bloedonderzoek

Bij uw opname in het ziekenhuis nemen we bloed bij u af. Het laboratorium onderzoekt uw bloed om na te gaan of u een infectie heeft. Deze bloedonderzoeken duren ongeveer 5 tot 8 dagen. Als duidelijk is welke bacterie de oorzaak is van uw endocarditis, wordt bepaald welke antibiotica nodig is.

Dit bloedonderzoek wordt ook later gedaan als blijkt dat uw lichaamstemperatuur hoger is dan 38,5 graad.

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis krijgt u verschillende bloedonderzoeken. Dit gebeurt een paar keer per week, om zo het verloop van de infectie goed te kunnen volgen. De cardioloog beoordeelt de bloedsuitslagen.

Elektrocardiogram (ECG)

Endocarditis kan leiden tot een verhoogde kans op hartritmestoornissen. In de eerste week van uw opname wordt daarom regelmatig een hartfilmpje (ECG) gemaakt. Daarmee registreren we de activiteit van uw hart. Na een stabiele periode wordt 2x per week een ECG gemaakt. Met dit onderzoek kunnen aanwijzingen aan het licht komen voor hartaandoeningen, zoals hartritmestoornissen, zuurstofgebrek van de hartspeer, een (eerder) hartinfarct en/of een vergroot hart (hypertrofie). De verpleegkundige maakt het hartfilmpje, de arts geeft u de uitslag.

Telemetrie

Het is mogelijk dat u de eerste week tijdelijk telemetriebewaking nodig heeft. Dat houdt in dat verpleegkundigen van de hartbewaking uw hartritme op afstand controleren en bewaken. Daarvoor krijgt u 6 plakkers (elektroden) op

uw bovenlichaam, die verbonden zijn aan een zender. De elektroden registreren 24 uur per dag uw hartritme en de zender stuurt dit draadloos door naar een monitor. U draagt de zender bij u in een draagbaar kastje.

Is er een draad losgeraakt? U blijft gewoon in beeld, maar meld dit wel bij de verpleegkundige. De verpleegkundige kan de draad weer vastmaken.

U kunt met de telemetrie over de afdeling wandelen en rond het trapenhuis, maar u mag er niet mee naar beneden of boven. Zie voor meer informatie de folder Telemetrie.

Echografie-Cor (hart)

Om een goed beeld te krijgen van de werking van uw hart kan de cardioloog een echografie van uw hart maken. Echografie geeft veel informatie over de werking van uw hart. Het laat bijvoorbeeld de bouw van het hart zien, de bloedstromen en de werking van de hartkleppen. Ook toont het mogelijke ophopingen van bloedbestanddelen met daarin bacteriën.

Het onderzoek

Echografie werkt met geluidsgolven. U ligt op uw linkerzij, de echolaborant gaat met een zender (de zogenoemde echokop) over uw ontholte bovenlichaam. De gel die daarbij wordt gebruikt, zorgt voor een goede geleiding van de zender over uw lichaam. Het onderzoek is vrij van risico's en vraagt geen voor- en nazorg.

Echocardiogram via de slokdarm (TEE)

Soms geeft een echocardiografie niet genoeg informatie over het hart. Dan is vervolgonderzoek nodig in de vorm van slokdarmechografie. Daarbij kijkt de cardioloog vanuit de slokdarm naar uw hart, de werking van uw hartkleppen en eventuele afwijkingen.

Met slokdarmechografie (Transoesophagale Echocardiografie, ofwel TEE) kan de cardioloog het hart van zeer dichtbij bestuderen. De slokdarm loopt namelijk

vlak achter het hart langs. De TEE kan bij bewustzijn worden gedaan of onder een roesje (sedatie genoemd).

Vorbereiding zonder sedatie:

- voor een slokdarmecho is het belangrijk dat u nuchter bent. Krijgt u de TEE zonder roesje? Dan eet en drinkt u niets in de 4 uur vóór het onderzoek
- u krijgt een operatiejasje aan voor het onderzoek
- u krijgt een infuus aan uw rechterarm
- heeft u een kunstgebit? Dan mag u dat uitdoen voor het onderzoek

Vorbereiding met sedatie:

- in geval van sedatie is het belangrijk dat u nuchter bent.
U mag de 6 uren voor het onderzoek niets eten en drinken
- u krijgt een operatiejasje aan voor het onderzoek
- er wordt een infuus ingebracht aan uw rechterarm
- heeft u een kunstgebit? Dan mag u dat uitdoen voor het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling eerste hart-long hulp (afdeling B0) of op de hartbewaking (CCU, afdeling B1). Als gekozen is voor sedatie, brengt de verpleegkundige u met uw bed naar de afdeling toe en anders met een rolstoel.

Het onderzoek

Een cardioloog en een hartfunctielaborant voeren het onderzoek uit. U wordt aangesloten op een monitor waarmee zij uw hartritme in de gaten kunnen houden. De cardioloog vertelt u precies wat u moet doen.

Er wordt een zogenoemde echoprobe ingebracht: dat is een slang met echofunctie, die is ingesmeerd met een verdovende gel. Dit kan zittend of liggend gebeuren. Daarna gaat u op uw zij liggen. Uw luchtweg blijft volledig vrij, waardoor u dus gewoon kunt ademen. Vanuit de slokdarm maken de cardioloog en hartfunctielaborant echobeelden van uw hart. Deze beelden worden opgeslagen om ze later goed te kunnen beoordelen. Als u wilt, kunt u op het beeldscherm meekijken.

Nadat er voldoende beelden zijn gemaakt, wordt het slangetje verwijderd. Het onderzoek is wat onaangenaam en duurt ongeveer 15 minuten. Als het onderzoek onder sedatie plaatsvindt, merkt u tijdens het onderzoek niets.

Meer informatie vindt u in de folder 'Echocardiogram via de slokdarm'. U vindt deze folder op www.nwz.nl/patientenfolders.

Na het onderzoek

Ging u onder sedatie, dan wordt u na het onderzoek weer rustig wakker. Achteraf kunt u wat last hebben van de keel. Het eerste uur mag u nog niet drinken, omdat uw keel nog verdoofd is. Na 1 uur mag u voorzichtig water drinken op aanwijzing/instructie van de verpleegkundige. Gaat dit goed, dan mag u alles eten en drinken.

Onderzoek naar de oorzaak van de endocarditis

Naast de hiervoor genoemde onderzoeken, doen we onderzoek naar de oorzaak van de endocarditis. Welke onderzoeken dat zijn, is afhankelijk van wat de arts als mogelijke veroorzaker ziet, maar ook van uw klachten. Een van de meest voorkomende onderzoeken is controle van het gebit door de kaakchirurg. Soms kan de oorzaak van de endocarditis niet worden gevonden.

■ De behandeling

De behandeling kan plaatsvinden:

- in het ziekenhuis of
- thuis, meer informatie hierover vindt u verderop in deze folder


Afhankelijk van uw situatie bespreekt de specialist de mogelijkheden met u.

Antibiotica

Is de diagnose endocarditis gesteld, dan moet u direct worden behandeld met antibiotica. Dit krijgt u via een infuus toegediend. De duur van uw behandeling is ongeveer 6 weken.

Het is mogelijk dat wordt gekozen voor de zogenoemde PICC-lijn voor het toe-

dienen van de antibiotica. Een PICC-lijn (Perifeer Ingebrachte Centraal veneuze Catheter) wordt ingebracht in een ader in de bovenarm. Het uiteinde van de lijn komt in de grote holle ader in de borstkas, vlak boven het hart. Op de afbeelding hieronder ziet u een PICC-lijn.



Voordelen PICC-lijn:

- minder infectiegevoelig dan een gewoon infuus
- bloedafname kan via de PICC-lijn worden gedaan, zodat u minder hoeft worden geprikt
- de PICC-lijn kan 3 maanden tot 2 jaar blijven zitten

Zie voor meer informatie de folder over de PICC-lijn. U vindt deze folder op www.nwz.nl/patientenfolders.

Behandeling thuis

In sommige gevallen is het mogelijk dat uw behandeling thuis voortgezet kan worden. Dit hangt af van de bacterie die de ontsteking veroorzaakt en het verloop van uw ziekteproces in het ziekenhuis. Daarnaast moet de oorzaak van de endocarditis bekend zijn. Voor elke patiënt geldt dat wij kijken of de behandeling eventueel, na minimaal 2 weken in het ziekenhuis te zijn geweest, thuis voortgezet kan worden.

Wanneer er akkoord is voor het voortzetten van de behandeling thuis, schakelen wij de transferverpleegkundige in. Zij draagt zorg voor het organiseren van de thuisbehandeling. Het duurt gemiddeld zo'n 5 werkdagen om de benodigde zorg te regelen. Voor de thuisbehandeling is het noodzakelijk dat u een PICC lijn heeft. Deze krijgt u tijdens uw opname in het ziekenhuis geplaatst.

Wat kunt u verwachten bij de thuisbehandeling?

Antibiotica toediening:

- u ontvangt thuis een draagbare infuuspomp, meer informatie hierover vindt u in de folder 'infuustherapie thuis'. Deze pomp draagt u de gehele dag bij zich in een tasje
- dagelijks komt er een verpleegkundige van het technisch-thuiszorgteam langs. Zij verwisselt de antibiotica. Daarnaast verzorgt hij/zij de PICC-lijn
- de antibiotica haalt u, afhankelijk van het soort antibiotica, éénmaal per week op bij de poliklinische apotheek in het ziekenhuis. Meer informatie hierover ontvangt u van de transferverpleegkundige

Afspraken:

- u komt wekelijks naar het ziekenhuis voor een poliafspraak bij de verpleegkundig specialist of de cardioloog
- de dag vóór de poliafspraak neemt een medewerker van Starlet bij u thuis bloed bij u af. De volgende dag bekijkt de specialist de uitslag en bespreekt deze met u tijdens de poliafspraak

Belangrijk voor de thuisbehandeling

Het is noodzakelijk dat u dagelijks uw temperatuur meet. Is uw temperatuur hoger dan 38,5 graden? Neemt u dan direct contact op met de eerste hart-long hulp, zoals u hieronder kunt lezen.

Wanneer neemt u contact op met het ziekenhuis?

Het is belangrijk dat u direct contact opneemt met de eerste hart-long hulp bij de onderstaande symptomen:

- koorts hoger dan 38,5 graden

- koude rillingen
- de insteek opening van de PICC-lijn vurig rood ziet
- een snelle of onregelmatige hartslag
- toename van kortademigheid bij inspanning of rust

U kunt in de bovenstaande gevallen contact opnemen met 072 – 548 4321.

Operatie

Bij ernstige beschadiging van de hartklep door endocarditis moet deze tijdens een hartoperatie worden vervangen door een kunstklep. Deze operatie vindt in principe plaats ná de behandeling met antibiotica. U wordt hiervoor overgeplaatst naar het VU Medisch Centrum in Amsterdam.

Bij zeer ernstige afwijkingen van de hartklep wordt deze vervangen tijdens de behandeling met antibiotica. Ter voorbereiding op een operatie controleert de kaakchirurg mogelijk uw gebit. Een ontsteking in het gebit kan tijdens een hartoperatie namelijk een ontsteking op het hart veroorzaken.

■ Leefregels

Voeding

U hoeft vanwege de endocarditis geen speciaal dieet te volgen. U kunt zich wel de eerste 2 weken erg ziek voelen. Hierdoor kunt u weinig eetlust hebben en/of kan het eten erg vermoeiend zijn. De voedingsassistent en de verpleegkundigen kunnen daarom bijhouden wat u eet en drinkt. Als er problemen dreigen te ontstaan met uw voeding- of vochtinname, neemt de verpleegkundige contact op met de diëtist en kunt u zo nodig drinkvoeding krijgen.

Emoties

De opname vanwege endocarditis kan voor u niet gemakkelijk zijn. U bent waarschijnlijk enorm geschrokken van het feit dat u een ontsteking heeft aan het hart en dat u geruime tijd in het ziekenhuis moet blijven. Hierdoor kunt u te maken krijgen met uiteenlopende emoties en gevoelens zoals angst, onzekerheid en bezorgdheid over de thuis- en/of werksituatie. Probeer uw gevoel niet op te kroppen, maar te uiten naar uw naasten of de verpleegkundige. Dat komt

uw herstel ten goede. De verpleegkundige overlegt met u of u wilt praten met een maatschappelijk werker of geestelijk verzorger.

Wanneer de diagnose is gesteld en de verwachting is dat u geruime tijd (weken) bent opgenomen in het ziekenhuis, krijgt u een casemanager toegewezen. Dit is een verpleegkundige van de afdeling die voor u en uw familie het vaste aanspreekpunt is.

Vochtbeperking

Zijn uw hartkleppen zo aangedaan dat u hartfalen heeft gekregen? Dan is het belangrijk dat u niet teveel vocht binnenkrijgt: per 24 uur maximaal 1500 ml. Bij hartfalen kan het hart namelijk niet veel vocht verwerken, door de verminderde pompkracht van het hart. Is dit voor u van toepassing, dan meldt de verpleegkundige, cardioloog of arts-assistent dit aan u. U krijgt dan een vochtlijstje waarop u zelf kunt bijhouden hoeveel u drinkt.

Beweging

Tijdens de opname in het ziekenhuis is het belangrijk om actief te blijven. In de eerste week zijn er veel onderzoeken naar de endocarditis, waardoor u mogelijk weinig zin heeft om te bewegen. Toch is dit wel heel belangrijk: uw conditie blijft beter op peil en het heeft positief effect op uw herstel. Zo nodig wordt een fysiotherapeut ingeschakeld. De fysiotherapeut kijkt samen met u naar hoe u tijdens de ziekenhuisopname kunt bewegen (mobiliseren).

Let erop dat u niet over uw grenzen heengaet en daardoor kortademig wordt. Probeer ervoor te zorgen dat u hele zinnen kunt blijven uitspreken.

■ Hartrevalidatie na ontslag

Hartrevalidatie is een effectieve manier om te werken aan herstel na behandeling van een hartprobleem/hartziekte. Een gezonde leefstijl bijvoorbeeld is belangrijk om kans op nieuwe klachten te verkleinen. Tijdens het revalidatieprogramma leert u om te gaan met eventuele vermoeidheidsklachten, angst en onzekerheid. De revalidatieprogramma's bieden u en uw partner of andere

naasten hulp, advies en ondersteuning bij het vinden van de juiste balans in uw leven. Zie voor verdere informatie de folder 'Hartrevalidatie'.

■ Tandarts

Zoals u hiervoor heeft kunnen lezen, kan een wond of infectie van het mondslijmvlies of tandvlees een oorzaak zijn van endocarditis. Heeft u eenmaal endocarditis gehad, dan bent u risicopatiënt: er is kans op herhaling. Meld daarom bij uw tandarts, orthodontist en mondhygiëniste dat u endocarditis heeft gehad. Zij registreren dit in hun systeem en kunnen u, zo nodig, vóór de behandeling antibiotica geven.

■ Uw vragen

Met vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek cardiologie, locatie Alkmaar, via telefoonnummer: 072 - 548 2700.

De polikliniek is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08:30 - 11:30 uur en van 13:00 - 16:00 uur. Of neem digitaal contact op via [Mijn Noordwest \(nwz.nl/mijnnoordwest\)](https://mijnnoordwest.nl/mijnnoordwest).

Vragen die u aan uzelf kunt stellen

Om na te gaan of u voldoende informatie heeft gekregen over endocarditis kunt u de volgende vragen aan uzelf stellen:

- wat is endocarditis?
- wat voor endocarditis heb ik? En om welke bacterie gaat het?
- welke medicatie (antibiotica) heb ik gehad tijdens de opname?
- welke leefregels zijn belangrijk voor mijn herstel?
- wat moet ik aan mijn leefstijl veranderen?
- krijg ik vervolgafspraken?
- bij wie kan ik terecht met vragen?

U kunt uw vragen achter in deze folder noteren.

Noordwest Ziekenhuisgroep

Postbus 501

1800 AM Alkmaar

www.nwz.nl

tel 072 - 548 4444

Colofon

Redactie cardiologie
 communicatie

Druk Ricoh

Bestelnummer 270449

Op alle onderzoeken en behandelingen van Noordwest Ziekenhuisgroep zijn de algemene voorwaarden van Noordwest Ziekenhuisgroep van toepassing, zie www.nwz.nl