



een peritoneaal dialyse katheter

Waarom deze folder?

U krijgt binnenkort een peritoneaal dialyse katheter. In deze folder leest u hoe deze katheter wordt aangelegd en hoe u er mee om moet gaan.

Wat is een peritoneaal dialyse katheter?

Een peritoneaal dialyse katheter is een slangetje van kunststof van ongeveer 40 cm lang. Het gaat door uw buikvlies (peritoneum) naar uw buikholte. De katheter heeft u nodig voor de dialysebehandeling. Hij wordt tijdens een operatie geplaatst. Na de operatie komt hij ongeveer 15 cm uit uw buik. Daarna duurt het minimaal twee weken voordat u met de dialysebehandeling kunt beginnen, omdat de katheter eerst moet vastgroeien.

Uw voorbereiding

Anesthesie

De operatie vindt plaats onder algehele anesthesie (narcose) of soms onder regionale anesthesie (bijvoorbeeld een ruggenprik). Hierover heeft u een gesprek gehad met de anesthesioloog tijdens het inloopsprekuur van de polikliniek anesthesiologie. De volgende onderwerpen zijn toen met u besproken:

- uw gezondheidstoestand,
- welke anesthesie bij u wordt toegepast (algehele of regionale anesthesie),
- het eventueel aanpassen van uw medicijnen rond de operatie,
- informatie over niet eten en drinken (nuchter zijn).

Meer informatie vindt u in de brochure 'Anesthesie en operatieafdeling'. Deze heeft u van de medewerker van de polikliniek anesthesiologie meegekregen.

Opname

Gewoonlijk wordt u de dag voor de operatie opgenomen. Waar u wordt opgenomen is afhankelijk van de chirurg die de operatie uitvoert.

Op de dag van de operatie komt de dialyseverpleegkundige langs om de plek van de katheter te bepalen. Hierbij wordt rekening gehouden met de plaats van de band van de broek of rok, huidplooiën of littekens. Dit om te voorkomen dat de katheter bekneeld raakt. De dialyseverpleegkundige zet met een stift een stip op de juiste plek op uw buik. Maar de chirurg bepaalt de uiteindelijke plaats van de katheter. Voor de operatie neemt een verpleegkundige wat neusslijm af met een wattenstokje. Dit neusslijm wordt op kweek gezet om te onderzoeken of er bacteriën in uw neus zitten die infecties kunnen veroorzaken bij de operatiewond. Uit voorzorg krijgt u neuszalf (Bactroban®), die u vijf dagen achtereen 's morgens en 's avonds in uw neusvleugels smeert.

Tijdens de operatie

De chirurg heeft u uitgelegd wat er tijdens de operatie gebeurt. De operatie duurt ongeveer 45 minuten.

Na de operatie

Na de operatie heeft u twee wondjes: een buikwond van 3 tot 8 cm met hechtingen en een gaatje waar de katheter zo'n 15 cm uitsteekt. Dit heet de huidpoort. Na de operatie controleert de dialyseverpleegkundige de operatiewonden. Zonodig wordt uw buikwond opnieuw verbonden. Het verband moet vijf tot zeven dagen blijven zitten. Als u pijn heeft na de operatie kunt u een pijnstillers vragen aan de verpleegkundige van de afdeling waar u bent opgenomen. Vraag hier gerust om! In principe mag u de volgende dag weer naar huis. Uiteraard op voorwaarde dat de arts toestemming heeft gegeven.

Complicaties

De meeste operaties en de periode erna verlopen zonder problemen. In een uitzonderlijk geval komen er complicaties voor. Zoals bij elke operatie is er ook bij deze operatie een kleine kans op nabloeding, wondinfectie, trombose of longontsteking.

Verder is er een kleine kans op een ontsteking van de huidpoort. Tekenen van een ontsteking zijn:

- zwelling en roodheid,
- er komt vocht of pus uit de huidpoort,
- pijn,
- in een later stadium kunt u koorts krijgen.

Als u deze verschijnselen heeft, adviseren wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met de dialyse afdeling. Deze is van maandag tot en met zaterdag te bereiken van 7.30 tot 21.00 uur op telefoonnummer (072) 548 2855.

Leefregels voor thuis

Om de wond goed te laten genezen adviseren wij u tot de controleafspraak rekening te houden met de volgende zaken:

- Het verband dat u in het ziekenhuis heeft gekregen moet blijven zitten.
- De wond mag niet nat worden, daarom kunt u niet douchen of in bad.
- Vermijd het tillen van zware voorwerpen.
- Vermijd persen.
- Ondersteun uw buik bij het hoesten.
- Als er vocht of bloed uit de wond komt, adviseren wij u om contact op te nemen met de dialyseafdeling. Deze is van maandag tot en met zaterdag te bereiken van 7.30 tot 21.00 uur op telefoonnummer (072) 548 2855.

Controle afspraak

Na de operatie maakt de dialyseverpleegkundige regelmatig afspraken met u om de wond en de huidpoort te controleren. Hoe vaak u moet terugkomen is afhankelijk van hoe uw wond en huidpoort genezen. De eerste afspraak krijgt u van de dialyseverpleegkundige bij uw ontslag uit het ziekenhuis. Gewoonlijk worden de hechtingen na ongeveer tien dagen verwijderd.

Ook krijgt u dan ook een laboratoriumformulier voor bloedonderzoek. Regelmatig bloedonderzoek is nodig om te bepalen wanneer u met de dialyse kunt beginnen. Gewoonlijk is dit na twee weken.

Uw vragen

Wanneer u na het lezen van deze folder nog vragen heeft of wanneer er problemen zijn met de katheter, dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van de dialyseafdeling, huisnummer 079. Zij zijn van maandag tot en met zaterdag te bereiken van 7.30 tot 21.00 uur op telefoonnummer (072) 548 2855. Buiten deze tijden kunt u naar telefoonnummer (072) 548 4444 bellen. De portier zorgt er dan voor dat u in contact komt met een dialyseverpleegkundige.