



# Röntgenfoto van baarmoeder en eileiders

Hystero-salpingografie (HSG)

# Inhoudsopgave

**Om eventuele afwijkingen aan de baarmoeder en eileiders op te sporen, worden er in overleg met uw gynaecoloog röntgenfoto's gemaakt. In deze folder vindt u uitleg over dit onderzoek.**

## **Uw arts in MCA**

Medisch Centrum Alkmaar (MCA) is een topklinisch opleidingsziekenhuis. Mogelijk krijgt u daarom niet alleen te maken met de gynaecoloog zelf, maar ook met arts-assistenten. Waar in deze folder gynaecoloog staat, kunt u daarom ook arts-assistent lezen. Een arts-assistent is een volledig bevoegde arts - al dan niet in opleiding tot gynaecoloog - die u onder verantwoordelijkheid van en in nauw overleg met uw gynaecoloog onderzoekt en behandelt.

## **Röntgenfoto's van de baarmoeder en eileiders**

Met röntgenfoto's van de baarmoeder wordt vooral de doorgankelijkheid van de eileiders onderzocht. Maar soms komen

tijdens dit onderzoek ook zeldzame baarmoederafwijkingen aan het licht.

## **Wanneer worden de foto's gemaakt?**

De foto's worden ná uw laatste menstruatiedag en vóór de volgende eisprong gemaakt. Dit is meestal binnen 2 weken na de 1e dag van uw eerstvolgende menstruatie. U krijgt op de polikliniek gynaecologie een ingevuld röntgenformulier mee.

## **Zo maakt u een afspraak**

U belt op één van de eerste dagen van uw eerstvolgende menstruatie de assistente van uw gynaecoloog om een afspraak te maken.

*Houdt u er rekening mee dat het onderzoek eventueel ook pas na een maand gepland kan worden. Dit omdat het onderzoek niet dagelijks wordt gedaan.*

## **Vorbereiding op het onderzoek**

### **Alleen gemeenschap mét condoom**

U mag vanaf de 7e dag van uw eerstvolgende menstruatie tót de dag van het onderzoek alleen gemeenschap hebben met een condoom. Dit is

belangrijk omdat u niet nét zwanger mag zijn op het moment dat de foto's gemaakt worden. Ná het onderzoek is dit geen probleem.

### **Bent u allergisch voor jodium?**

Bent u allergisch voor jodium? Geef dit door aan uw gynaecoloog.

### **Neem gerust iemand mee**

Het onderzoek is snel voorbij en is eigenlijk nooit (erg) pijnlijk. Toch wordt het door de meeste vrouwen als onaangenaam ervaren. Neem daarom gerust iemand mee. Uw partner of andere begeleider mag tijdens het hele onderzoek bij u blijven. Dit is ook prettig omdat u na het onderzoek misschien wat draaierig bent en/of menstruatie-achtige buikpijn heeft. Uw begeleider kan u dan naar huis brengen.

## **Het onderzoek**

### **Waar wordt u verwacht?**

U wordt voor het onderzoek verwacht op de afdeling radiologie van MCA, huisnummer 131. Volg vanaf de hoofdingang de rode lijn. Neem vervolgens de rode trap naar de 1e verdieping. Houd links aan, u ziet de

afdeling radiologie dan vanzelf. U kunt zich bij de balie melden.

### **Het onderzoek**

Het onderzoek wordt gedaan door een gynaecoloog, een röntgenlaborant en een radioloog. U ligt tijdens het onderzoek op een tafel met een röntgentoestel. De gynaecoloog brengt eerst een spreider (speculum) in uw vagina. Daarna plaatst de gynaecoloog een slangetje in de baarmoederhals. Om het slangetje goed op zijn plaats te houden, wordt daarbij een ballonnetje opgeblazen. De gynaecoloog spuit contrastvloeistof door dit slangetje in de baarmoeder en eileiders. De radioloog maakt vervolgens enkele röntgenfoto's. Als u weer aangekleed bent, wordt na ongeveer 15 minuten nog een foto gemaakt via de buik. Dit is nodig om na te gaan of de contrastvloeistof zich normaal door de buik heeft verspreid. U mag na het onderzoek meteen naar huis.

### **Na het onderzoek**

Normale klachten na het onderzoek  
Het kan zijn dat uw buik na het onderzoek nog enkele dagen gevoelig is. U voelt dan een soort menstruatiekrimp.

U kunt zo nodig de pijnstillers paracetamol gebruiken. Mogelijk verliest u verder nog enkele dagen wat bloed, vermengd met jodium en contrastvloeistof. Houdt u er rekening mee dat uw eerstvolgende menstruatie wat heviger kan zijn dan u gewend bent.

### **Bij welke klachten waarschuwt u het ziekenhuis?**

Neem bij (een van) de volgende klachten meteen contact op met het ziekenhuis:

- koorts
- hevige buikpijn
- veel bloedverlies

U kunt contact opnemen met de polikliniek gynaecologie, telefoon 072 - 548 29 00. Of buiten kantooruren met de afdeling verloskunde, telefoon 072 - 548 29 25.

### **Uitslag**

Vaak is tijdens het onderzoek op het beeldscherm al goed te zien of de eileiders open zijn of niet. Maar het kan ook zijn dat dit pas goed te beoordelen is als de foto's ontwikkeld zijn. U krijgt de definitieve uitslag binnen 3 weken tijdens uw controleafspraak met uw gynaecoloog. De gynaecoloog bespreekt dan ook het eventuele vervolg met u.

### **Vervolgonderzoek**

Als er afwijkingen op de baarmoederfoto te zien zijn, is eventueel een kijkoperatie nodig. Uw gynaecoloog bespreekt dit dan met u.

### **Uw vragen**

Met vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met de polikliniek gynaecologie, verloskunde en voortplantingsgeneeskunde. Dat kan op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur, telefoon 072 - 548 29 00.

*Meer informatie over een röntgenfoto van de baarmoeder en eileiders vindt u ook op [www.nvog.nl](http://www.nvog.nl)*

180965/2015.06