



allergie huidpriktest bij kinderen

informatie voor ouders / verzorgers

Uitleg over het onderzoek

Uw kind is doorverwezen voor een huidpriktest. In deze folder vindt u uitleg over de reden van het onderzoek, hoe u uw kind kunt voorbereiden op het onderzoek en over het onderzoek zelf. Het onderzoek wordt gedaan door een speciaal opgeleide longfunctieassistent. Eén van de ouders/verzorgers mag aanwezig zijn bij het onderzoek.

Waarom krijgt uw kind dit onderzoek?

Met de huidpriktest gaan we na of uw kind allergisch is voor bepaalde stoffen. Met deze test kunnen we de aanleg voor gevoeligheid van de slijmvliezen aantonen voor bepaalde stoffen die we inademen. We noemen deze stoffen 'inhalatie allergenen'. We doen dit door deze stoffen - bijvoorbeeld huisstofmijt of haar van huisdieren - in opgeloste vorm als een druppel op de huid aan te brengen. Daarna wordt met een klein prikkertje door de druppel heen in de huid geprikt. We bekijken vervolgens of de huid op de stof reageert.

Vóór het onderzoek stoppen met medicijnen

Kort voor het onderzoek mag uw kind een aantal medicijnen **niet gebruiken**. Dit is zeer belangrijk voor het slagen van het onderzoek. In het schema hieronder ziet u om welke medicijnen het gaat.

Antihistaminica in tabletten of drankjes stoppen vanaf 1 week voor het onderzoek:

- Xyzal (= levocetirizine)
- Aeries (= desloratidine)
- Atarax (= hydroxyzine)
- Tavegil (= clemastine)
- Zyrtec (= cetirizine)
- Claratine (= loratadine)
- Fenestil (= dimetindeen)
- Telfast (fexofenadine)
- Zaditen (= ketitofen) 2 weken voor het onderzoek

Steroidhoudende crèmes of zalven vanaf 24 uur voor het onderzoek:

- Hydrocortison
- Emovate
- Triamcinolon
- Cutivate

Het onderzoek - allergie huidpriktest

We brengen eerst altijd 2 controledruppels aan op de huid. De ene druppel bevat histamine en geeft in elk geval een reactie. Dit laat zien dat de test goed werkt. De andere druppel is het oplosmiddel voor de allergene stoffen waar we de test mee uitvoeren. Deze druppel met alléén het oplosmiddel hoort geen reactie te geven.

Vervolgens brengen we aan de binnenkant van beide onderarmen van uw kind druppels van de stoffen aan waarvan we vermoeden dat ze de oorzaak zijn van de allergische reactie. Heeft uw kind ernstig eczeem op de armen, dan brengen we de druppels aan op de rug. Vervolgens prikken we met een klein prikkertje door de druppel heen in de huid. Dit voelt als een klein speldenprikje.

Na het aanprikken van de huid moeten de stoffen even inwerken. Is uw kind allergisch voor een bepaalde stof dan reageert de huid hierop. Bijvoorbeeld met een wit bultje - als een muggenbult - met een rood cirkeltje eromheen. Uw kind mag niet aan dit bultje krabben. Na ongeveer 10 tot 15 minuten - afhankelijk van het aantal druppels - lezen we de huidpriktest af. Het is direct zichtbaar voor welke stoffen uw kind eventueel gevoelig (allergisch) is. Het onderzoek duurt gemiddeld een ½ uur.

Na het onderzoek

Na het onderzoek heeft u een afspraak - soms aansluitend - met de arts of verpleegkundig specialist kindergeneeskunde die de uitslag van het onderzoek met u en uw kind bespreekt. U kunt dan al uw vragen stellen.

Kom op de afgesproken tijd

We hebben tijd gereserveerd voor uw kind. Het is daarom belangrijk dat u op de afgesproken tijd komt. Is uw kind verhinderd? Geef dit dan zo vroeg mogelijk aan ons door. Het telefoonnummer van de polikliniek kindergeneeskunde vindt u hieronder.

Uw vragen

Informatie over MCA voor u en uw kind vindt u op www.mca.nl/kids. Met vragen of voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met de polikliniek kindergeneeskunde, huisnummer 119. Het telefoonnummer is op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur 072 - 548 29 50.