

Instructieschema bloedverdunnende medicijnen

Instructieschema

bloedverdunnende medicijnen

Tijdelijk stoppen met bloedverdunnende medicijnen

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Dan kan het zijn dat u hier voor de behandeling tijdelijk mee moet stoppen. Dit is onder andere afhankelijk van of u in uw rug of hals behandeld wordt.

U vindt de instructies in het schema hieronder.

- schema A, bij een behandeling in de rug
- schema B, bij een behandeling in de hals

Het is belangrijk dat u de instructies goed opvolgt. De behandeling kan anders waarschijnlijk niet doorgaan.

Heeft u voor de behandeling eerst een aparte afspraak met de anesthesioloog-pijnspecialist? Dan kruist de anesthesioloog-pijnspecialist in het schema aan met welke medicijnen u eventueel tijdelijk moet stoppen.

Als uw anesthesioloog-pijnspecialist niets in het schema heeft aangekruist, betekent dat niet automatisch dat u gewoon met de bloedverdunnende medicijnen kunt doorgaan. Neem daarom bij twijfel of met vragen altijd contact op via het telefonisch spreekuur.

Schema A: behandeling in de rug

- 1 Acenocoumarol (Sintrom): altijd stoppen: u hoort dit van de trombosedienst
- 2 Fenprocoumon (Marcoumar): altijd stoppen: u hoort dit van de trombosedienst
- 3 Fraxiparine / Fraxodi / Innohep: **24 uur** voor behandeling stoppen
- 4 Acetylsalicylzuur (Cardio 80): u mag met dit medicijn doorgaan
- 5 Carbasalaatcalcium (Ascal): u mag met dit medicijn doorgaan
- 6 Asasantin: u mag met dit medicijn doorgaan
- 7 Dipyridamol (Persantin): u mag met dit medicijn doorgaan
- 8 Tigracelor (Brilique): 5 dagen voor behandeling stoppen
- 9 Prasugrel/ Clopidogrel (Plavix, Grepid): 7 dagen voor behandeling stoppen
- 10 Fondaparinux (Arixtra): 2 dagen voor behandeling stoppen
- 11 Dabigatran (Pradaxa): 2-5 dagen voor behandeling stoppen, uw arts bepaalt dit
- 12 Rivaroxaban (Xarelto)/ Apixaban: 2 dagen voor behandeling stoppen

Als u niets anders met uw anesthesioloog-

pijnspecialist heeft afgesproken, mag u de medicijnen waar u tijdelijk mee gestopt bent 's avonds na de behandeling weer gewoon innemen.

Schema B: behandeling in de hals

- 1 Acenocoumarol (sintrom): altijd stoppen, u hoort dit van de trombosedienst
- 2 Fenprocoumon (Marcoumar): altijd stoppen, u hoort dit van de trombosedienst
- 3 Fraxiparine / Fraxodi / Innohep: **24 uur** voor behandeling stoppen
- 4 Acetylsalicylzuur (Cardio 80): u mag met dit medicijn doorgaan
- 5 Carbasalaatcalcium (Ascal): u mag met dit medicijn doorgaan
- 6 Asasantin: 5 dagen voor behandeling stoppen
- 7 Dipyridamol (Persantin): u mag met dit medicijn doorgaan
- 8 Tigracelor (Brilique): 5 dagen voor behandeling stoppen
- 9 Prasugrel/ Clopidogrel (Plavix, Grepid): 7 dagen voor behandeling stoppen
- 10 Fondaparinux (Arixtra): 2 dagen voor behandeling stoppen
- 11 Dabigatran (Pradaxa): 2-5 dagen voor behandeling stoppen, uw arts
- 12 Rivaroxaban (Xarelto)/ Apixaban: 2 dagen voor behandeling stoppen
- 13 Ibuprofen/ Advil/Aleve : u mag met dit medicijn doorgaan
- 14 Diclofenac (Voltaren): u mag met dit medicijn doorgaan
- 15 Naproxen: u mag met dit medicijn doorgaan
- 16 Elecoxib (Celebrex) en Etoricoxib (Arcoxia): u mag met dit medicijn doorgaan
- 17 Aspro, Femapirin, Nurofen en Zafen: uw arts bepaalt of dit gestopt moet worden
- 18 Alka-Seltzer: uw arts bepaalt of dit gestopt moet worden

Als u niets anders met uw anesthesioloog-pijnspecialist heeft afgesproken, mag u de medicijnen waar u tijdelijk mee gestopt bent 's avonds na de behandeling weer gewoon innemen.

Neem in deze gevallen **altijd** contact op met het Pijncentrum:

1. Als u denkt of vermoedt dat u misschien niet zomaar met uw bloedverdunnende medicijnen mag stoppen. Omdat u **recent** gezondheidsproblemen heeft gehad waarvoor u bloedverdunnende medicijnen gebruikt bijvoorbeeld.

2. Als u niet één maar **twee soorten** bloedverdunnende medicijnen uit het schema gebruikt.
3. Als het bloedverdunnende medicijn dat u gebruikt **niet** in het schema staat.

Belangrijk:

In bepaalde gevallen mag u **niet** zomaar met bloedverdunnende medicijnen stoppen. Als u recent gezondheidsproblemen heeft gehad waarvoor u bloedverdunnende medicijnen gebruikt bijvoorbeeld. Geldt dit voor u? Of twijfelt u hierover? Neem dan **altijd** voor overleg zo spoedig mogelijk contact op met het Pijncentrum. Dat kan tijdens het dagelijkse telefonische spreekuur van 13:00 - 14:00 uur, telefoon 072 - 548 4224.

U kunt uw vraag ook mailen

U kunt uw vraag ook mailen naar pijnbestrijding@nww.nl. Vermeld ook uw naam en geboortedatum. Afhankelijk van uw vraag nemen wij dan binnen 1 of 2 werkdagen contact met u op.

Afspraak pijnpolikliniek Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Den Helder

Heeft u een afspraak gehad op de pijnpolikliniek van het Gemini Ziekenhuis? En bent u verwezen naar het Pijncentrum Noord-Holland voor uw behandeling? Dan hoeft u voor uw vragen geen contact op te nemen met het Pijncentrum.

U kunt voor al uw vragen terecht bij de pijnpolikliniek van locatie Den Helder. Dat kan op werkdagen van 09:00 - 10:00 uur en 13:00 - 14:00 uur. Op vrijdag van 09:00 - 10:00 uur, telefoon 0223 - 69 6903.

Datum:

.....

Paraaf arts / medewerker:

.....

183561 / 2016.10

Op alle behandelingen in Noordwest Ziekenhuisgroep zijn de algemene voorwaarden van Noordwest Ziekenhuisgroep van toepassing, zie www.nww.nl of vraag bij de balie van patiëntenvoorlichting.