



medisch centrum alkmaar

Correctie van afstaande oren

Plastische chirurgie

[mca.nl](https://www.mca.nl)

Correctie van afstaande oren

U wilt uw afstaande oren (flaporen) laten corrigeren. Afstaande oren komen veel voor. Ze zijn het gevolg van een aangeboren misvorming van het kraakbeenskelet van de oorschelp. In deze folder leest u hoe de stand van uw oren gecorrigeerd kan worden met een operatie. De operatie heet in medische termen otoplastiek. Oto betekent oor en plastiek betekent vormgeven.

Uw voorbereiding

Wij raden u aan zes weken voor de operatie te stoppen met roken. Nicotine vernauwt de bloedvaten, waardoor u problemen bij de wondgenezing kunt krijgen.

Voor de operatie mag u geen bloedverdünnende medicijnen gebruiken. Meestal adviseren we:

- Stop tien dagen voor de operatie met het gebruik van aspirine (ook 'kinder'-aspirine), Ascal APC of Asprobruis.
- Stop drie dagen voor de operatie met het gebruik van Sintrom(mitis) of Acenocoumarol.

Besprek uw gebruik van bloedverdünnende medicijnen altijd van tevoren met uw plastisch chirurg en anesthesioloog.

Correctie van afstaande oren vindt plaats onder plaatselijke of gehele verdoving (narcose). Informatie over volledige verdoving en de voorbereiding krijgt u

tijdens een voorbereidend gesprek met de anesthesioloog. De informatie kunt u nalezen in de brochure 'Anesthesie en operatieafdeling'.

Opname

Het rechtzetten van uw oren onder plaatselijke verdoving vindt plaats op de polikliniek. U kunt dan direct of een paar uur na de operatie weer naar huis. Wanneer u volledige verdoving krijgt wordt u een dag opgenomen op de dagbehandeling chirurgie (huisnummer 030). In dat geval verzoeken wij u een dag voor de opname de algemene informatie van de dagbehandeling chirurgie door te nemen.

Hoe verloopt een correctie van afstaande oren?

Tijdens de operatie maakt de chirurg een snee direct achter uw oor en modelleert het kraakbenige skelet van het oor. Ook verwijdert hij het stukje huid, dat aan de achterkant van het oor overblijft als het oor dicht tegen het hoofd komt. Daarna

wordt de operatiewond gehecht. Meestal gebeurt dit met oplosbare hechtingen die vanzelf verdwijnen. De operatie duurt ongeveer een uur.

Na de operatie

Na de oorcorrectie krijgt u een strak verband om uw hoofd, dat meestal een week moet blijven zitten. Gewoonlijk kunt u de dag van de operatie weer naar huis. Tegen de pijn kunt u pijnstillers innemen zoals paracetamol. Bij extreme pijn of nabloeden moet u direct contact opnemen met de plastisch chirurg. Na een week verwijdert de plastische chirurg of de assistent van de polikliniek eventuele niet oplosbare hechtingen.

Vaak zijn de oorschelpen nog wekenlang wat rood, gezwollen en (koude-) gevoelig. Dit verdwijnt geleidelijk. Soms blijven de oren geruime tijd gevoelig bij koude.

Leefregels

Vanwege het verband kunt u de eerste week na de operatie uw haar niet wassen. Als het verband verwijderd is, moet u twee weken of langer nog 's nachts een haarband of een zwachtel dragen ter bescherming van uw oren. Uw arts vertelt u hoe lang u deze moet dragen. Ook overdag moet u, bijvoorbeeld tijdens sporten, voorzichtig zijn met uw oren.

Risico's en complicaties

Ook al is de kans klein, toch kunnen er bij een correctie van afstaande oren bijwerkingen en complicaties optreden.

Dit geldt overigens voor elke operatie.

De wond kan gaan nabloeden of er kan een infectie optreden.

Hoewel de correctie van afstaande oren blijvend is, heeft kraakbeen soms de neiging om in zijn oude vorm terug te keren. Een nieuwe operatie kan dan nodig zijn.

Mogelijkheden en verwachtingen

Als u overweegt uw oren recht te laten zetten, is het belangrijk om reële verwachtingen te hebben over de verbetering van de stand van uw oren. Zo is een absolute gelijkvormige stand van beide oren vrijwel onmogelijk. De resultaten van oorcorrecties zijn over het algemeen goed. Het litteken achter uw oor is blijvend, maar meestal niet opvallend.

Verzekering

Een correctie van afstaande oren wordt niet in alle gevallen vergoed door uw ziektekostenverzekering. Daarom raden wij u aan vooraf contact op te nemen met uw verzekering. Mocht een tweede operatie nodig zijn om een optimaal resultaat te

verkrijgen, dan kunnen de kosten voor uw rekening komen.

Uw vragen

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de polikliniek plastische chirurgie voor een afspraak. De polikliniek plastische chirurgie (huisnummer 041) is op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer (072) 548 2550.

Dagbehandeling chirurgie

Alleen wanneer u wordt opgenomen op de dagbehandeling chirurgie en u heeft direct na de behandeling vragen, dan kunt u op de dag van de behandeling tot 21.00 uur contact opnemen met de dagbehandeling chirurgie op telefoonnummer (072) 548 42 00. Bij geen gehoor of na 21.00 uur is de afdeling spoedeisende hulp telefonisch bereikbaar op (072) 548 24 88. Indien noodzakelijk maken we voor u een controleafspraak in overleg met de specialist. Tot slot geeft de medewerker van de dagbehandeling chirurgie u een brief mee. Het kan namelijk gebeuren dat u

binnen 24 uur klachten krijgt waarvoor u contact moet opnemen met de dienstdoende huisarts of de afdeling spoedeisende hulp van het MCA. De arts die u dan behandelt heeft de brief nodig. Heeft u in deze 24 uur geen klachten gehad? Bezorg de brief dan binnen een week bij uw eigen huisarts.

Tot slot

Deze informatie is een aanvulling op het gesprek met uw plastische chirurg en kan per persoon afwijken. Daarom kunt u aan deze folder geen garantie ontlenuen betreffende het resultaat. Plastische chirurgie en esthetische chirurgie zijn geen exacte wetenschappen. Complicaties kunnen altijd optreden, ook al besteden we veel zorg aan uw behandeling.

Wij wensen u een voorspoedig herstel.

Medisch Centrum Alkmaar

Wilhelminalaan 12

1815 JD Alkmaar

T (072) 548 44 44

mca.nl/plastischechirurgie

119413 / 2011.03

Op alle behandelingen in MCA zijn de algemene voorwaarden van MCA van toepassing, zie www.mca.nl of vraag bij de balie van patiëntenvoorlichting

mca.nl