



medisch centrum alkmaar

Correctie van de onderoogleden

Plastische chirurgie

[mca.nl](https://www.mca.nl)

Inhoudsopgave

Oorzaak	3
Uw voorbereiding	3
Hoe verloopt een onderoogcorrectie?	3
Na de operatie	4
Complicaties	4
Verzekering	5
Tot slot	5
Uw vragen	6
Notities	7

Colofon

Redactie: afdeling plastische chirurgie
afdeling marketing & communicatie

Vormgeving: beeldgroep MCA

Oplage: 200 / 2e druk / 2012

Druk: Ricoh

Artikelnummer: 97557

Op alle behandelingen in MCA zijn de algemene voorwaarden van MCA van toepassing, zie www.mca.nl of vraag bij de balie van patiëntenvoorlichting

Deze folder geeft u informatie over de onderooglidcorrectie en wat u van deze operatie kan verwachten. De operatie wordt ook wel blepharoplastiek genoemd (blepharo betekent ooglid en plastiek komt van plastische chirurgie).

Oorzaak

Veel mensen hebben last van een huidoverschot van de oogleden, al dan niet met wallen onder hun ogen. De wallen zijn het gevolg van het slapper worden van de huid en de spier rondom het oog en/of van een vetophoping onder het oog. Soms ontstaat er zwelling door vochtophoping in het ooglid. Vaak wordt een onderooglidcorrectie gecombineerd met een bovenooglidcorrectie.

Uw voorbereiding

Voor de operatie mag u geen bloedverdünnende medicijnen gebruiken. Meestal wordt de regel aangehouden:

- Stop tien dagen voor de operatie met het gebruik van aspirine (ook 'kinder'-aspirine), Ascal, APC of asprobruis.

- Stop drie dagen voor de operatie met het gebruik van Sintrom(mitis).

Bespreek dit van tevoren met uw plastisch chirurg.

Daarnaast adviseren wij u voor de operatie een zak diepvries doperwten of kapucijners in huis te hebben om hiermee uw oogleden na de operatie te koelen. Doe van tevoren een handvol diepgevroren doperwten in zes plastic (diepvries) zakjes. Twee plastic zakjes knoopt u zo aan elkaar dat zij goed op de oogleden passen. Doe deze zakjes in een pantykous en knoop deze rond het hoofd. De twee andere setjes bewaart u in de diepvries en u kunt ze dan om en om gebruiken.

Hoe verloopt een onderoogcorrectie?

Correctie van de onderoogleden kan zowel onder plaatselijke als onder volledige verdoving plaatsvinden. De plaatselijke verdoving wordt door de plastisch chirurg uitgevoerd op de polikliniek. U mag korte tijd na de operatie al weer naar huis. Als u volledige verdoving krijgt, wordt u opgenomen op de dagbehandeling chirurgie (huisnummer 028).

Correctie van de onderoogleden

Informatie over de volledige verdoving krijgt u dan van de anesthesioloog. Als u op de dagbehandeling chirurgie wordt opgenomen, verzoeken wij u een dag voor de behandeling de algemene informatie van de dagbehandeling chirurgie door te nemen.

Bij de operatie maakt de plastisch chirurg een snee onder de oogharen van de onderoogleden naar de buitenste ooghoek. Daarna wordt het overtollige vet verwijderd of verplaatst en het huidoverschot weggehaald. De huid wordt naar de zijkant toe strakgetrokken en gehecht. Afhankelijk van de gekozen techniek duurt de operatie gemiddeld 1 tot 1 1/2 uur.

Na de operatie

Na een ooglidcorrectie kunnen de behandelde oogleden dik en blauw worden. Het komt echter bijna nooit voor dat dit zo ernstig is dat u niets meer kunt zien. Er worden pleisters aangebracht om de zwelling te beperken. Deze pleisters blijven zitten tot het eerste controlebezoek aan de specialist. Wij adviseren u om thuis de oogleden zoveel mogelijk te koelen met de

diepgevroren zakjes erwten of capucijners. Als de zakjes erg koud zijn, is het aan te raden om eerst een dun zakdoekje op de oogleden te leggen. Dit om de oogleden tegen bevriezen te beschermen. Het is ook verstandig de dagen tot de eerste controle rust te nemen. De pijn en de zwelling worden daarmee tegengegaan. Een pijnstillers is dan meestal niet nodig. De medewerker van de polikliniek verwijdert na vier tot zes dagen de hechtingen. U kunt gewoon douchen. Dep uw ogen daarna voorzichtig droog.

Complicaties

Ook al is de kans erop erg klein, toch kunnen bij ooglidoperaties - net zoals bij elke operatieve ingreep - bijwerkingen en complicaties optreden.

Een enkele keer komt meer bloedlekage voor dan normaal. Dit is meestal niet ernstig, maar het duurt langer voordat de oogleden er normaal uitzien. Ook kunt u last krijgen van gevoelloosheid van de oogleden, een trekkend litteken of wat vochtophoping rond de ogen. Na verloop van tijd verdwijnen deze klachten echter vanzelf. Dit kan soms enkele maanden duren.

Bij een nabloeding in het vetweefsel kan er een verhoogde druk in de oogkas ontstaan, waardoor de oogzenuw kan beschadigen.

Deze complicatie gaat gepaard met hevige pijn en een daling van het gezichtsvermogen. Deze verschijnselen zijn zeer zeldzaam, maar als u deze verschijnselen krijgt, moet u direct contact opnemen met de plastisch chirurg. Een chirurgische ingreep is dan dringend nodig.

Zelden treedt bij een onderooglidcorrectie een ectropion op. Bij een ectropion krult de binnenzijde van het onderooglid naar buiten, zodat het niet meer tegen de oogbol aan zit.

Het veroorzaakt irritatie en een tranenvloed. Om dit te verhelpen kan een nieuwe operatie nodig zijn.

Een nieuwe operatie is soms nodig als de oogleden niet helemaal symmetrisch zijn, de ooglidwal niet geheel is weggenomen, of een nieuwe wal is ontstaan als gevolg van verdere verslapping van de huid en de spier rondom het oog. Aan zwelling van de oogleden door vochtophoping kan weinig worden gedaan.

Verzekering

Een correctie van het huidoverschot van de bovenoogleden wordt in het algemeen vergoed als het huidoverschot het gezichtsveld verstoort. Correcties van de onderoogleden vergoedt uw ziektekostenverzekering bijna nooit. Absolute symmetrie bij dubbelzijdige operaties is niet te garanderen. Soms is het noodzakelijk om een aanvullende operatie uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat. Deze aanvullende operatie kan extra kosten met zich meebrengen. Deze kosten moeten door u worden betaald of worden door uw verzekering vergoed.

Tot slot

Deze informatie is een aanvulling op het gesprek met uw plastisch chirurg. De bovenstaande informatie kan echter nooit volledig zijn voor iedere individuele situatie. Daarom kunt u aan de folder geen garantie ontleen betreffende het resultaat. Plastisch chirurgie en esthetische chirurgie is geen exacte wetenschap. Complicaties kunnen altijd optreden, ook al besteden wij veel zorg aan uw behandeling.

Correctie van de onderoogleden

Uw vragen

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de polikliniek plastische chirurgie voor een afspraak. De polikliniek plastische chirurgie (huisnummer 041) is op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer (072) 548 25 50.

Dagbehandeling chirurgie

Wanneer u bent opgenomen op de dagbehandeling chirurgie en u heeft direct na de behandeling vragen, dan kunt u op de dag van de behandeling met de dagbehandeling chirurgie contact opnemen.

De afdeling is bereikbaar op werkdagen van 7.00 tot 21.00 uur, telefoonnummer (072) 548 42 00.

Bij geen gehoor of na 21.00 uur is de spoedeisende hulp telefonisch bereikbaar op (072) 548 24 88. Indien noodzakelijk maken we voor u een controleafspraak in overleg met de specialist.

Tot slot versturen wij een digitale brief naar uw huisarts. Hierin informeren wij hem/haar over uw behandeling.



Notities

A series of 18 horizontal dotted lines for taking notes.

Medisch Centrum Alkmaar

Wilhelminalaan 12

1815 JD Alkmaar

T (072) 548 44 44

mca.nl/plastischechirurgie

mca.nl