



medisch centrum alkmaar

# Correctie van de boven oogleden

Plastische chirurgie

[mca.nl](http://mca.nl)

# Inhoudsopgave

Oorzaak	1
Uw voorbereiding	1
Hoe verloopt een correctie van de bovenoogleden?	1
Na de operatie	2
Complicaties	3
Verzekering	3
Tot slot	3
Uw vragen	4
Notities	5

## Colofon

Redactie:            plastische chirurgie  
                          afdeling marketing & communicatie

Vormgeving:        beeldgroep MCA

Oplage:             500 / 2e druk / 2011

Druk:                Ricoh

Artikelnummer:    98237

*Op alle behandelingen in MCA zijn de algemene voorwaarden van MCA van toepassing, zie [www.mca.nl](http://www.mca.nl) of vraag bij de balie van patiëntenvoorlichting*

**Deze folder geeft informatie over de correctie van uw bovenoogleden.**

**De operatie wordt ook blepharoplastiek genoemd (blepharo betekent ooglid en plastiek betekent vormverandering).**

### **Oorzaak**

Veel mensen hebben last van huidoverschot van de bovenoogleden. Als u ouder wordt, wordt de huid slapper, verslappen uw spieren en ontstaat er vetophoping rond de ogen. U kunt daar klachten van ondervinden, er te oud uitzien of een belemmerd zicht hebben door uw overhangende bovenoogleden. Vaak wordt een correctie van de bovenoogleden gecombineerd met die van de onderoogleden.

### **Uw voorbereiding**

Voor de operatie mag u geen bloedverdünnende medicijnen gebruiken. Meestal adviseren we:

- Stop tien dagen voor de operatie met het gebruik van aspirine (ook 'kinder'-aspirine), Ascal, APC of Asprobruis.

- Stop drie dagen voor de operatie met het gebruik van Sintrom(mitis) of Acenocoumarol.

Bespreek uw gebruik van bloedverdünnende medicijnen altijd van tevoren met uw plastisch chirurg. Daarnaast adviseren wij u voor de operatie een zak diepvriesdoperwten of in huis te hebben om uw oogleden na de operatie te koelen. Doe van tevoren twee eetlepels doperwten in zes plastic (diepvries)zakjes en knoop deze per twee aan elkaar, zodat zij goed op uw oogleden passen. Bewaar ze in de diepvries.

### **Hoe verloopt een correctie van de bovenoogleden?**

Een correctie van de bovenoogleden gebeurt onder plaatselijke verdoving of narcose. Een ingreep onder plaatselijke verdoving gebeurt op de polikliniek. Als u volledige verdoving krijgt, wordt u opgenomen op de dagbehandeling chirurgie (huisnummer 028).

Wij verzoeken u dan een dag voor de opname de algemene informatie van de dagbehandeling chirurgie door te nemen.

# Correctie van de bovenoogleden

## Anesthesie

Als u van de plastisch chirurg te horen heeft gekregen dat de operatie onder algehele anesthesie (narcose) plaatsvindt, krijgt u een bezoek aan het inloopspreekuur van de polikliniek anesthesiologie, waar u dan een gesprek heeft met de anesthesioloog. De volgende onderwerpen worden met u besproken:

- uw gezondheidstoestand;
- de anesthesie die bij u wordt toegepast
- het eventueel aanpassen van uw medicijnen rond de operatie;
- informatie over niet eten en drinken (nuchter zijn).

Meer informatie vindt u in de brochure 'goed voorbereid op uw operatie'.

Deze krijgt u van de medewerker van de polikliniek anesthesiologie.

## Tijdens de operatie

Tijdens de operatie maakt de chirurg een snee in de plooi van het bovenooglid en verwijdert overtollige huid, onderliggend spierweefsel en eventueel overtollige vet. Vervolgens hecht hij de huid.

Kraaienpootjes worden niet verwijderd. De operatie duurt drie kwartier tot een uur.

## Na de operatie

Na de ooglidcorrectie kunnen uw oogleden dik en blauw worden. Het is bijna nooit zo ernstig, dat u niet meer kunt zien. U krijgt pleisters op uw ogen om de zwelling te beperken.

Deze blijven zitten tot het eerste controlebezoek aan de plastisch chirurg vier tot zes dagen na de operatie. Dan worden ook de hechtingen verwijderd. Wij adviseren uw oogleden thuis zoveel mogelijk te koelen met de diepgevroren zakjes. Doe deze zakjes in een pantykous en knoop deze rond uw hoofd. Leg eerst een gaasje of dun doekje op uw oogleden. Dit voorkomt bevriezen. De twee andere setjes bewaart u in de diepvriezer. U kunt ze om en om gebruiken. Het is verstandig de dagen tot de eerste controle rust te nemen. De pijn en de zwelling worden daarmee tegengegaan. Een pijnstillert is dan meestal niet nodig, eventueel kunt u een paracetamol nemen. U kunt gewoon douchen. Dep daarna uw ogen voorzichtig droog.

## Complicaties

Al is de kans erg klein, toch kunnen bij ooglidoperaties, net als bij elke operatie, bijwerkingen en complicaties optreden.

- Een enkele keer komt meer bloedlekkage voor dan gewoonlijk. Dit is meestal niet ernstig, maar het duurt wel langer voordat de oogleden er weer normaal uitzien. Ook kunt u last krijgen van gevoelloosheid van de oogleden, een trekkend litteken of vochtophoping rond de ogen. Na verloop van tijd verdwijnen de klachten vanzelf. Soms duurt dit enkele maanden.
- Bij een nabloeding in het vetweefsel kan een verhoogde druk in de oogkas ontstaan, die uw oogzenuw kan beschadigen. De complicatie gaat gepaard met hevige pijn en een vermindering van uw gezichtsvermogen. De verschijnselen zijn zeer zeldzaam, maar wanneer u er last van krijgt, moet u direct contact opnemen met de plastisch chirurg, die u opereert om de druk te verlichten.
- In zeldzame gevallen ontstaat een epitheelcyste (holte met talg) in het litteken. De plastisch chirurg verwijdert deze cyste.
- Een nieuwe operatie is soms nodig als uw oogleden niet gelijk zijn of wanneer

er opnieuw een huidoverschot ontstaat door een verdere verslapping van de huid en spieren rond uw oog.

- Aan zwelling van de oogleden door vochtophoping kan weinig worden gedaan.

## Verzekering

Een correctie van het huidoverschot van de bovenoogleden wordt in het algemeen niet vergoed. Absolute gelijkvormigheid is bij dubbelzijdige operaties niet te garanderen. Wanneer het nodig is om een tweede operatie uit te voeren om een goed eindresultaat te verkrijgen, brengt dit extra kosten met zich mee. Deze kosten moeten door u worden betaald of worden door uw verzekering vergoed.

## Tot slot

Deze informatie is aanvulling op het gesprek met uw plastische chirurg en kan per persoon afwijken. Daarom kunt u aan deze folder geen garantie ontnemen betreffende het resultaat. Plastische chirurgie en esthetische chirurgie zijn namelijk geen exacte wetenschappen. Complicaties kunnen altijd optreden,

# Correctie van de bovenoogleden

ook al besteden we veel zorg aan uw behandeling.

## Uw vragen

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de polikliniek plastische chirurgie voor een afspraak. De polikliniek plastische chirurgie (huisnummer 041) is op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer (072) 548 25 50.

## Dagbehandeling chirurgie

Alleen wanneer u wordt opgenomen op de *dagbehandeling chirurgie* en u heeft direct na de behandeling vragen, dan kunt u op de dag van behandeling met de dagbehandeling chirurgie contact opnemen.

De afdeling is bereikbaar op werkdagen van 7.00 tot 21.00 uur, telefoonnummer (072) 548 42 00. Bij geen gehoor of na 21.00 uur is de spoedeisende hulp telefonisch bereikbaar op (072) 548 24 88.

Indien noodzakelijk maken we voor u een controleafspraak in overleg met de specialist.

Tot slot versturen wij een digitale brief naar uw huisarts. Hierin informeren wij hem/haar over uw behandeling.



## Notities

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Medisch Centrum Alkmaar**

Wilhelminalaan 12

1815 JD Alkmaar

T (072) 548 44 44

[mca.nl/plastischechirurgie](http://mca.nl/plastischechirurgie)

**mca.nl**