

Medicatie thuis na chirurgische dagbehandeling

Ruimte voor registratie-etiket

Operatiedag **Datum**

■ Schema

Neem alleen onderstaande pijnstillers in en gebruik geen andere zonder overleg met uw arts! Als u thuis gedurende 24 uur (bijna) geen pijn meer heeft en de pijn voor u acceptabel is, kunt u de pijnstillers verminderen. Heeft u de voorgeschreven pijnstillers ingenomen en na deze periode nog pijn, neem dan contact op met ons ziekenhuis. Contactgegevens vindt u op de laatste pagina van de brochure 'Wel thuis na een behandeling op de dagbehandeling chirurgie'.

<input type="checkbox"/> paracetamol 500 mg 4 x daags	2 tabletten om . . . uur	2 tabletten om . . . uur	2 tabletten om . . . uur	2 tabletten om . . . uur
<input type="checkbox"/> diclofenac 50 mg 3 x daags	1 tablet om . . . uur	1 tablet om . . . uur	1 tablet om . . . uur	X
<input type="checkbox"/> pantoprazol 40 mg 1 x daags	1 tablet om . . . uur	X	X	X
<input type="checkbox"/> tramadol 50 mg 3 x daags	1 tablet om . . . uur	1 tablet om . . . uur	1 tablet om . . . uur	X
<input type="checkbox"/> oxycontin 2 x daags	1 tablet om . . . uur	X	1 tablet om . . . uur	X

Overige medicijnen