

Schildkliercarcinoom behandeling met radioactief Jodium-131 (klinisch)

behandeling nucleaire geneeskunde

Waarom deze folder?

In deze folder leest u informatie over de behandeling van schildkliercarcinoom met radioactief Jodium-131 en hoe u zich op de behandeling en de opname in een therapiekamer voorbereidt.

Uw afspraken op een rijtje

Naam:

Bloed laten prikken bij het afnamelaboratorium (035) in de Noordwest Ziekenhuisgroep:
dag datum

We verwachten u op de afdeling nucleaire geneeskunde (0030) voor het voorbereidende onderzoek en gesprek op:

dag datum om uur (injectie)

dag datum om uur (scan & gesprek)

We verwachten u op de afdeling interne geneeskunde 2 (149) op:

dag datum om uur (behandeling & opname)

Indien van toepassing levert u 's morgens vóór de opname uw ochtendurine in bij het laboratorium (035) voor een zwangerschapstest.

We verwachten u op de afdeling nucleaire geneeskunde (0030) op:

dag datum om uur (scan na behandeling)

Vorbereiding op de behandeling

Deze voorbereiding zorgt ervoor dat er zo min mogelijk jodium in het lichaam aanwezig is. Het radioactieve Jodium-131 wordt hierdoor zo optimaal mogelijk opgenomen waardoor het effect van de behandeling wordt vergroot.

- 2 maanden voor behandeling geen jodiumhoudende contrastmiddelen of jodium op de huid (bijvoorbeeld bij een operatie)
- 4 weken voor behandeling stoppen met schildkliermedicatie; vanaf.....
- van 1 week vóór de scan tot de inname van de therapiecapsule het jodiumbeperkt dieet volgen (zie aparte folder) van.....tot.....

De dag van de behandeling met radioactief Jodium-131

De dag dat u komt om de capsule met radioactief jodium in te nemen mag u vóór 7.30 uur:

- een kopje thee of koffie zonder melk drinken, daarnaast mag u onbeperkt water drinken
- een beschuitje met jam zonder boter eten
- tot één uur na inname van de capsule met radioactief jodium mag u niets eten, wel mag u water drinken

Na de behandeling

Gedragsregels in acht nemen (zie bijlage 1).

Doel van de behandeling

Het radioactieve Jodium-131 zal worden opgenomen door het resterende schildklier- of tumorweefsel. Het opgenomen radioactieve jodium bestraalt van binnenuit het weefsel waarin het is opgenomen.

Bekijk het fotoverhaal over de schildklierbehandeling

Op onze website www.nwz.nl/schildkliertherapie vindt u het fotoverhaal over uw verblijf op de afdeling interne geneeskunde, huisnummer 149. Om u voor te bereiden, is het belangrijk dat u thuis dit fotoverhaal en deze folder goed doorneemt.

Uw toestemming

Nadat u op de afdeling uitleg over de behandeling heeft gekregen, vragen wij u het formulier te ondertekenen waarin u toestemming geeft:

- voor het uitvoeren van de behandeling en
- het eventuele gebruik van uw (anonieme) gegevens voor kwaliteitsverbetering, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Belangrijk om door te geven

Vrouwen jonger dan 50 jaar en niet gesteriliseerd zijn zullen voorafgaand aan de toediening een zwangerschapstest ondergaan. Het is belangrijk dat u ons vooraf op de hoogte brengt als u zwanger bent (of denkt te zijn) of borstvoeding geeft. De behandeling kan niet doorgaan, als u (mogelijk) zwanger bent. U dient voor de behandeling te stoppen met borstvoeding.

Scan en het berekenen van de dosis

Een week voor de behandeling wordt een schildklier- en total body scintigrafie (scan) uitgevoerd. U krijgt hiervoor op de eerste dag een injectie in uw arm. De dag hierna wordt de scan gemaakt. Dit onderzoek duurt 15 tot 90 minuten. Op basis van deze scan berekenen we welke dosis radioactief jodium u nodig heeft voor de therapie. Na de scan volgt een gesprek met de nucleair geneeskundige. Daar kunt u met uw vragen terecht.

De opname

U wordt opgenomen op een aparte kamer op de afdeling interne geneeskunde 2 (149). Deze kamer heeft een bed, douche, toilet, wastafel, tafel met stoel en klok. Er is ook WIFI, radio en televisie. Een verpleegkundige houdt met u een opnamegesprek over de gang van zaken en maakt u wegwijs op de afdeling en in uw kamer.

Toediening

De nucleair geneeskundige geeft u op uw kamer een capsule met radioactieve jodium. Die slikt u met wat water door. Wij raden u aan de eerste 24 uur veel te drinken. Het radioactief jodium dat niet door de schildklier wordt opgenomen, verlaat uw lichaam met name via de urine. Doorgaans verdwijnt dit binnen twee tot drie dagen. Het maakt niet uit wat u drinkt (het eerste uur na het innemen van de capsule mag u geen melkproducten).

Wat neemt u mee bij uw opname?

Gedurende de opname zorgt u voor uzelf, want na het innemen van de capsule met radioactief jodium mag u niet van uw kamer af. Dit is om anderen niet aan straling bloot te stellen en besmetting met radioactiviteit tegen te gaan. Er zijn geen beperkingen ten aanzien van eten, drinken, tijd van opstaan of slapengaan.

U brengt alleen mee wat u werkelijk denkt nodig te hebben voor uw verblijf op de kamer, te weten:

- een paar setjes oud ondergoed, 2 stelletjes oude dag- en nachtkleding
 - u kleedt zich 's morgens gewoon aan; voordat u de capsule krijgt, kunt u uw oude kleding aantrekken en voordat u met ontslag gaat, kleedt u zich weer om
 - draag bij voorkeur slechts één stel oude kleren; als u weggaat, laat u uw gebruikte kleding en andere gebruiksvoorwerpen in uw kamer achter
 - deze spullen worden in een opslagruimte bewaard tot ze niet meer radioactief zijn en daarna weggegooid
- draag liever geen sieraden, een bril is wel toegestaan
- voor 5 dagen de medicijnen die u gewend bent in te nemen, dit geldt niet voor de medicijnen waarmee u moest stoppen voor de behandeling
- voor 5 dagen kleine hoeveelheden verzorgingsmiddelen, zoals tandpasta
- iets om uzelf bezig te houden, zoals tijdschriften
- eventueel uw eigen mobiele telefoon of laptop
 - de laptop mag alleen op tafel gebruikt worden, niet op het bed
 - na ontslag mag deze mobiele telefoon en/of laptop de eerste zes weken alleen door uzelf worden gebruikt
 - er is een WiFi netwerk
- u mag zelf speciale eet- of drinkwaren meenemen, zoals dieetartikelen, snoep en frisdrank
- als u een speciaal dieet moet volgen, wilt u dit dan bekendmaken bij de verpleging
- eetwaren die gekoeld bewaard worden, kunt u afgeven op de afdeling
- u kunt op de afdeling melk, karnemelk, koffie, thee, appelsap en sinaasappelsap krijgen

Afspraken tijdens uw verblijf

Vanaf het ogenblik dat u de capsule geslikt heeft, zorgt u voor uzelf. U bent alleen op uw kamer. Als u iets nodig heeft, dan zorgt de verpleegkundige daar meestal voor. U kunt dat vragen door de zusteroproep te gebruiken. Hij/zij neemt dan via de intercom contact met u op. Als de verpleegkundige naar u toe komt, moet u in uw kamer blijven en afstand houden.

Als er maaltijden of consumpties worden gebracht, melden wij dit door de intercom. Daarna zetten wij de spullen op het plankje bij de deur. Na de maaltijd kunt u afval en wegwerpmateriaal in de bak in uw kamer doen. Vuil linnengoed mag u onder uw wastafel neerleggen.

Houdt u er rekening mee dat vooral uw urine radioactief is. Hier is de kans op radioactieve besmetting dus het grootst.

Om de ruimte waarin u zich bevindt zo min mogelijk radioactief te besmetten, zijn een aantal gedragsregels opgesteld:

- plas altijd **zittend** op het toilet (ook de heren!)
- gebruik altijd toiletpapier, ook als u alleen heeft geplast
- spoel het toilet steeds tweemaal door met het deksel op de bril
- was uw handen goed na het gebruik van het toilet
- we vragen u dringend om voor het douchen eerst naar het toilet te gaan; dit om te voorkomen dat u onbedoeld urine verliest tijdens het douchen.
- laat na het douchen de douchekraan lopen tijdens het afdrogen
- spetter zo min mogelijk met water; poets uw tanden zo laag mogelijk bij de wasbak
- laat na het tandenpoetsen de kraan nog 5 minuten lopen
- draag handschoenen bij het verwisselen van incontinentiemateriaal
- heren: scheert u zich in de badkamer boven de wastafel

Bezoek

U kunt tijdens uw verblijf geen bezoek ontvangen. Dit is om blootstelling aan straling en besmetting met radioactiviteit tegen te gaan. Stuit dit op onoverkomelijke problemen, overleg dan vóór de opname met de verpleging.

Meting

Na het slikken van de capsule komt een medewerker van de afdeling nucleaire geneeskunde iedere dag meten hoeveel straling u afgeeft. Zo beoordelen we wanneer het veilig is om weer naar huis te gaan. Uw verblijf kan variëren van één tot tien dagen. Meestal duurt de opname tussen de één en vijf dagen.

Naar huis

Voordat u naar huis gaat hoort u of en zo ja, welke medicijnen u weer kunt innemen. U kunt reizen op de manier die u schikt. Vermijd echter trein- of busreizen van langer dan een half uur. Wij adviseren u om na de behandeling met radioactief jodium een controle afspraak te maken bij uw internist. Na de behandeling is de internist weer uw hoofdbehandelaar.

Gedragsregels na ontslag

Er is nu nog maar weinig radioactief jodium in uw lichaam achtergebleven. U hoeft daarom niet meer geïsoleerd te worden. Maar u kunt anderen nog in lichte mate aan straling blootstellen. De hoeveelheid straling dient zo veel mogelijk te worden beperkt. Dit geldt in het bijzonder voor het contact met kleine kinderen. U wordt daarom dringend verzocht de gedragsregels in bijlage 1 op te volgen. Anderen (en met name uw huisgenoten) ontvangen dan zo weinig mogelijk straling. De nucleair geneeskundige vertelt u of u deze gedragsregels moet opvolgen gedurende één of twee weken na ontslag uit het ziekenhuis. Verzorgt u kinderen jonger dan 10 jaar? De periode dat u de gedragsregels moet opvolgen wordt dan met een extra week verlengd.

Nascan

Ongeveer één week na de behandeling wordt op de afdeling nucleaire geneeskunde opnieuw een scan gemaakt. Voor deze scan maken we gebruik van het resterende jodium in uw lichaam. U krijgt dus niet opnieuw een injectie of capsule. Het onderzoek duurt ongeveer 45 tot 60 minuten.

Waar vindt u de afdeling nucleaire geneeskunde en interne geneeskunde 2?

U vindt de afdeling nucleaire geneeskunde op huisnummer 0030. Hiervoor volgt u de borden 0030. De afdeling interne geneeskunde 2 vindt u op huisnummer 149. Voor deze afdeling volgt u de borden 149. De afdelingen zijn zowel via de hoofdingang aan de Wilhelminalaan als de ingang Metiusgracht goed bereikbaar. Op onze website www.nwz.nl vindt u meer informatie over de bereikbaarheid van het ziekenhuis en de mogelijkheden voor parkeren.

Uw vragen

Op www.nwz.nl vindt u meer informatie over de afdeling nucleaire geneeskunde.

Heeft u nog vragen dan kunt u:

- uw vraag mailen naar nucleairegeneeskunde@nwz.nl of
- bellen naar de afdeling nucleaire geneeskunde telefoonnummer (072) 548 3480

De afdeling nucleaire geneeskunde is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 16:30 uur.

Bijlage 1

gedragsregels na jodiumtherapie

De nucleair geneeskundige vertelt u of u deze gedragsregels moet opvolgen gedurende één of twee weken na ontslag uit het ziekenhuis. Verzorgt u kinderen jonger dan 10 jaar? De periode dat u de gedragsregels moet opvolgen wordt dan met een extra week verlengd.

Houd afstand

Uw huisgenoten moeten zo veel mogelijk afstand van u houden. In ieder geval meer dan een meter. Bij langdurige aanwezigheid - zoals bij televisiekijken of tijdens het eten - moeten uw huisgenoten het liefst een afstand houden van twee meter of meer. Ga niet naar bijeenkomsten waarbij u enige tijd vlak bij iemand zit, zoals vergaderingen of voorstellingen.

Toiletbezoek

Bij toiletbezoek moet u altijd zittend plassen, ook de heren. Gebruik steeds toiletpapier, ook als u alleen heeft geplast. Was uw handen als het kan bij het fonteintje in de wc. Zo blijven deurknoppen en dergelijke zo schoon mogelijk.

Partner

Wij bevelen u sterk aan dat u en uw partner apart slapen: op minstens twee meter afstand van elkaar. Het is nog beter om in aparte kamers te slapen. Grenzen die kamers aan elkaar, zorg er dan voor dat de bedden niet tegen dezelfde muur staan. Daardoor zou er alsnog te weinig afstand kunnen zijn. Beperk knuffelen en seksueel contact tot totaal maximaal dertig minuten per dag. Is uw partner boven de zestig jaar, dan hoeft u de regels onder 'houd afstand' en 'partner' niet zo strikt na te leven. Bij personen boven deze leeftijd is het stralingsrisico zeer gering. De overige maatregelen dient u echter wel op te volgen.

Kinderen

Kinderen beneden de zestien jaar zijn gevoeliger voor straling dan de gemiddelde volwassene. Daarom is het belangrijk dat u de regels goed naleeft. Hebt u zelf kinderen, laat ze dan bij voorkeur door een huisgenoot verzorgen. Is dat niet mogelijk, breng ze dan (indien mogelijk) zolang onder bij familie of vrienden. Houd geen baby's of peuters op schoot. Als u kinderen jonger dan 10 jaar verzorgt dan wordt de periode dat u de gedragsregels moet opvolgen met een extra week verlengd. Borstvoeding is reeds gestaakt voor de behandeling met radioactief jodium. Hervat deze niet meer na uw ontslag uit het ziekenhuis. Na een volgende bevalling kunt u wel weer zonder problemen borstvoeding geven.

Bezoekers

Bij kortdurend bezoek (bijvoorbeeld een avond of een middag) hoeft u voor bezoekers geen speciale maatregelen te treffen. Blijf wel afstand houden en vermijd lichamenlijk contact. Bezoek van kleine kinderen en zwangere vrouwen raden wij af.

Mobiele telefoon/laptop

Als u tijdens uw opname uw mobiele telefoon en/of laptop bij u had, mogen deze na ontslag de eerste zes weken alleen door uzelf worden gebruikt.

Reizen

In de eerste week mag u niet langer dan maximaal een half uur per keer met het openbaar vervoer reizen. Rijdt u met iemand mee in de auto, ga dan zo ver mogelijk van de bestuurder af zitten. Reizen met dezelfde chauffeur moet u beperken tot maximaal twee uur. Dit geldt ook voor taxi's. Gaat u binnen nu en twee maanden vliegen? Neem dan contact op met de afdeling nucleaire geneeskunde voor een douaneverklaring, ook wel vliegbrief genoemd.

Werk

U kunt in principe gewoon weer aan het werk gaan. Dit geldt niet als u in het basisonderwijs werkt of in de opvang van kinderen tot en met tien jaar. Dan moet u verzuimen zolang deze gedragsregels gelden. Bewaar op het werk, net als thuis, zo veel mogelijk afstand tot anderen. Overleg in twijfelgevallen altijd met de afdeling nucleaire geneeskunde.

Zwangerschap

We raden u af om het eerste jaar na de behandeling zwanger te worden. Voor mannelijke patiënten geldt het advies om gedurende een half jaar geen kinderen te verwekken. Als u maatregelen tegen zwangerschap neemt, is er geen enkel bezwaar tegen seksueel contact. Wel moet u één of twee weken na de behandeling de richtlijnen onder het kopje 'partner' in acht nemen.

Ziekenhuisopname

Mocht u worden opgenomen in het ziekenhuis tijdens de periode waarin deze gedragsregels gelden, brengt u dan de arts van desbetreffende afdeling op de hoogte.