

# CCTA (Coronair CT Angiografie) met PC-AKI preventie-infuus

## onderzoek van de kransslagaders van het hart

Op advies van uw behandelend arts krijgt u een Coronair CT Angiografie (CCTA). Dit is een onderzoek van de kransslagaders van het hart. In deze folder vindt u uitleg en instructies. Tijdens dit onderzoek krijgt u een contrastmiddel. Het contrastmiddel kan een (tijdelijke) achteruitgang van de nierfunctie veroorzaken. Voor patiënten met een verminderde nierfunctie treffen wij daarom voorzorgsmaatregelen. U krijgt extra vocht voor en na het CCTA onderzoek oftewel een PC-AKI preventie-infuus. Hiervoor wordt u deze dag opgenomen op de hartafdeling. Het CCTA onderzoek vindt plaats op de afdeling nucleaire geneeskunde.

### Hoe verloopt de dag?

U wordt op afdeling 210 ontvangen door een verpleegkundige die u deze dag begeleidt. Er wordt een hartfilmpje gemaakt en uw bloeddruk wordt opgemeten. Om uw nieren te beschermen krijgt u ongeveer 1 uur voor de scan een infuus met vocht. U gaat vervolgens naar afdeling nucleaire geneeskunde (huisnummer 0030) voor het onderzoek van de kransslagaders, de CCTA-scan. Na het onderzoek bespreekt de cardioloog de uitslag met u op de afdeling nucleaire geneeskunde. Uw begeleider kan hierbij aanwezig zijn. Na de uitslag gaat u terug naar afdeling 210, waar u via het infuus nog 6 uur vocht toegediend krijgt. Gaat u er vanuit dat u aan het begin van de avond met ontslag gaat.

### Uw voorbereiding

Voor een goed verloop van het onderzoek is het belangrijk dat u zich aan de volgende instructies voor de voorbereiding houdt. Het onderzoek kan anders eventueel niet doorgaan.

Wilt u op de dag van het onderzoek uw bovenlichaam niet insmeren met crème of bodylotion? De stickers die op uw lichaam worden geplakt blijven anders niet zitten.

### *Belangrijk om van tevoren door te geven*

- Bent u (mogelijk) zwanger of geeft u borstvoeding? Meld dit dan vóór het onderzoek.
- Indien u in het bezit bent van een niet-reanimeren verklaring, wilt u dit dan melden?
- Er wordt contrastmiddel met jodium gebruikt. Is bij een eerder onderzoek gebleken dat u hier allergisch voor bent? Geef dit dan van tevoren door aan de afdeling nucleaire geneeskunde én aan uw behandelend arts. Er kunnen dan voorzorgsmaatregelen worden genomen. Of u krijgt in overleg een ander onderzoek. (Een eventuele allergische reactie op jodium op uw huid, is géén teken dat u ook allergisch bent voor contrastmiddel met jodium.)

### *Eten en drinken*

- U mag **vanaf 24 uur vóór het tijdstip van uw afspraak** geen cafeïne houdende producten gebruiken zoals koffie, thee, cola, chocolade en energydranken.
- U mag **2 uur voor het onderzoek** nog een eenvoudige broodmaaltijd nuttigen, bijvoorbeeld één boterham met hierbij iets te drinken (zonder cafeïne). Hierna mag u niet meer eten, maar wel water drinken.

### *Medicijnen*

Neem uw ochtendmedicatie vóór het onderzoek in met een slokje water.

Let op: 24 uur voor het onderzoek mag u géén **Viagra**, **Revatio** of **Sildenafil** gebruiken.

Wilt u op de dag van het onderzoek een lijstje meenemen van alle medicijnen die u (eventueel) gebruikt?

### **Wat is een Coronair CT Angiografie (CCTA)?**

Een CCTA bestaat uit twee onderdelen. Eerst wordt met een CT-scan onderzocht hoeveel kalk in de kransslagaders van het hart aanwezig is. We noemen dit de calciumscore. Daarna wordt onderzocht of er vernauwingen in de kransslagaders aanwezig zijn. Deze opnames worden meteen na het onderzoek beoordeeld. Behalve de kransslagaders wordt ook het gedeelte van de borstkas dat in beeld is gebracht, beoordeeld. Na het onderzoek kunt u meteen naar huis en uw dagelijkse bezigheden hervatten.

### *Contrastmiddel met jodium*

Tijdens de CT-scan wordt jodiumhoudend contrastmiddel via een infuus in uw arm toegediend.

Hierdoor kunnen de bloedvaten goed in beeld worden gebracht. U kunt vlak na het inspuiten van het contrastmiddel (één van) de volgende klachten krijgen:

- warm gevoel
- vreemde smaak in de mond
- het gevoel te moeten plassen

Dit gaat na een paar minuten vanzelf weer over. De kans is heel klein, maar houdt u kort na het inspuiten verder rekening met (één van) de volgende bijwerkingen:

- misselijkheid
- jeuk
- galbulten
- niesbuien
- ernstige complicaties door een allergische reactie op het jodium

Het kan ook zijn dat deze bijwerkingen pas na enige minuten optreden. U moet daarom minstens 20 minuten na het inspuiten op de afdeling nucleaire geneeskunde blijven. Als u (één van) deze bijwerkingen krijgt, wordt u als dit nodig is meteen behandeld.

### **Overzicht van het onderzoek**

<b>tijd</b>	<b>handeling</b>
start infuus	U meldt zich op afdeling 210. Er wordt een hartfilmpje gemaakt en uw bloeddruk wordt gemeten. U krijgt een infuusnaald in uw hand of arm. Via het infuus krijgt u vocht, 1 uur voor de scan.
voorbereiding CCTA scan	U gaat naar afdeling nucleaire geneeskunde, huisnummer 0030. In de voorbereidingsruimte krijgt u uitleg en er worden een aantal vragen gesteld. Ook krijgt u ECG stickers op de borst geplakt. U wordt aan de hartmonitor gekoppeld en uw bloeddruk wordt gemeten. Het is belangrijk dat uw hartslag tijdens het onderzoek niet te hoog is. Zo nodig krijgt u daarom tijdens het onderzoek het medicijn Atenolol (in tabletvorm).

tijd	handeling
onderzoek calciumscore	<p>U wordt vervolgens naar de onderzoekskamer gebracht waar u op de onderzoekstafel gaat liggen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• u wordt aan een contrastvloeistofpomp gekoppeld</li> <li>• u krijgt uitleg over hoe u tijdens het onderzoek moet ademen</li> <li>• de scan voor de calciumscore wordt gemaakt</li> </ul> <p>Het is belangrijk dat u tijdens het hele onderzoek, ongeveer 15 minuten, goed stil ligt. Vanuit een naastgelegen ruimte houden de medewerkers en arts u tijdens het maken van de scan voortdurend in de gaten. U kunt via een intercom met hen praten.</p>
onderzoek CCTA met contrast	<p>Voor het tweede deel van het onderzoek krijgt u zo nodig via het infuus het medicijn Selokeen. Dit kan nodig zijn als uw hartslag te hoog is. Daarna:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• krijgt u 2 pufjes Nitrospray onder de tong</li> <li>• wordt in meerdere stappen de scan gemaakt: via de intercom vraagt de medewerker u tijdens elke stap uw adem een paar seconden in te houden</li> <li>• krijgt u via het infuus 2 keer contrastvloeistof toegediend: u kunt direct daarna een warm gevoel krijgen, een vreemde smaak in de mond of het gevoel te moeten plassen, dit gaat na een paar minuten weer over</li> </ul>
uitslag onderzoek	<p>U gaat naar de wachtkamer en de opnames worden beoordeeld. Dit duurt ongeveer 20 minuten tot 1 uur. U mag iets eten (zelf meenemen) en drinken. De cardioloog bespreekt vervolgens de uitkomsten van het onderzoek met u.</p>
resttijd infuus	<p>Hierna gaat u terug naar afdeling 210, waar u nog 6 uur vocht via het infuus krijgt. Gaat u ervan uit dat u aan het begin van de avond met ontslag gaat. Thuis kunt u uw gewone dagelijkse bezigheden hervatten.</p>

### **Claustrofobie?**

Heeft u last van claustrofobie? Geef dit dan meteen door aan de laborant als u opgehaald wordt. U krijgt dan zo nodig een rustgevend medicijn (oxazepam). Uw reactievermogen is daardoor de eerste 24 uur na het onderzoek verminderd. U mag daarom de eerste 24 uur na het onderzoek niet aan het verkeer deelnemen of gevaarlijke machines bedienen. Zorg er daarom voor dat iemand u na het onderzoek naar huis kan brengen.

### **Uw toestemming**

Nadat u op de afdeling uitleg over het onderzoek heeft gekregen, vragen wij u het formulier te ondertekenen waarin u toestemming geeft voor het uitvoeren van het onderzoek.

### **Uw vragen**

Meer informatie over straling vindt u op [www.nwz.nl/patientenfolders](http://www.nwz.nl/patientenfolders) in de folder met de titel 'Röntgenstraling of radioactiviteit'.

Met vragen over uw afspraak en het onderzoek kunt u op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur contact opnemen met het hartteam secretariaat van het hart-long centrum, telefoon 072 - 548 4493. Op [www.nwz.nl](http://www.nwz.nl) vindt u meer informatie over de afdeling nucleaire geneeskunde.