

Borstamputatie bij DCIS

Bij een borstamputatie wordt al het borstklierweefsel onderhuids en de tepel verwijderd. De borstspier blijft gespaard. Dit heet een borstamputatie of een ablatio. U verblijft hiervoor 1 nacht in het ziekenhuis. Hieronder vindt u informatie over de operatie en de periode daarna.

■ Opname: uw afspraken

Binnenkort wordt u opgenomen in ons ziekenhuis. Voor de voorbereiding op de operatie krijgt u een afspraak op het opnameplein. U heeft tijdens deze afspraak met diverse zorgverleners een gesprek zoals de anesthesioloog, de verpleegkundige en de apothekersassistent. Als u bloedverdunners gebruikt, heeft u ook een gesprek met een stollingsdeskundige. Het bezoek aan het opnameplein duurt ongeveer 1,5 uur. U vindt het opnameplein op:

- locatie Alkmaar bij de hoofdingang, huisnummer 068
- locatie Den Helder op de 1e verdieping, nummer 18

De afdeling, die uw opname regelt, informeert u verder over de bovengenoemde afspraak op het opnameplein.

Folder en filmpje

Meer informatie vindt u in de brochure 'Goed voorbereid op uw operatie'. Hierin staat onder andere wat u moet doen om u goed voor te bereiden op uw operatie. U krijgt deze brochure mee tijdens uw afspraak op het opnameplein. U kunt op onze website www.nwz.nl/operatie ook een filmpje over de voorbereiding op de operatie bekijken. U ziet alleen wat u bewust op de operatieafdeling meemaakt.

■ De operatie

U wordt opgenomen op een opnamekamer van een verpleegafdeling. Na de operatie komt u op een andere verpleegafdeling te liggen. De verpleegkundige begeleidt u bij de voorbereiding op de operatie. Tijdens de operatie bent u onder algehele narcose. De chirurg verwijdert de borst. De operatie duurt ongeveer een uur. De chirurg hecht de huid onderhuids met oplosbare hechtingen. Daarna wordt dit afgedekt met een pleister.

Wondvocht

Voor het afvoeren van wondvocht wordt er meestal een drain achtergelaten. Voordat u naar huis gaat, wordt deze verwijderd. Soms hoopt zich daarna toch nog wondvocht op in het wondgebied. Dat is normaal: het lichaam heeft de tijd nodig dit vocht zelf af te voeren. Het vocht kan onder de wond heen en weer gaan, omdat de huid nog niet vastzit aan de onderlaag. Ook dat is normaal, zie ook verder het inlegvel 'Nazorg adviezen na borstamputatie'.

■ Een patholoog onderzoekt het verwijderde borstklierweefsel

Na de operatie onderzoekt een patholoog het verwijderde borstklierweefsel. Er wordt onderzocht:

- of er in de snijvlakken geen DCIS aanwezig is
- de definitieve gradatie van de DCIS
- de grootte van het DCIS gebied
- of er geen borstkanker aanwezig is

■ Na de operatie

Na de operatie wordt u wakker op de uitslaapkamer. Als alle controles goed bij u zijn, komen de verpleegkundigen van de verpleegafdeling u ophalen. Op de afdeling controleert de verpleegkundige regelmatig:

- uw bloeddruk, pols en temperatuur
- uw wond op zwelling, kleur en de hoeveelheid wondvocht

De zaalarts komt langs om te kijken hoe het met u gaat en om uw vragen te beantwoorden. Hij of zij beoordeelt ook wanneer u naar huis kunt.

Let op uw wond

Als u nog in het ziekenhuis bent, raden wij u aan om samen met de verpleegkundige - die voor u zorgt - de wond te bekijken. Als u het prettig vindt kan hier een naaste bij zijn. Bespreek dit met de verpleegkundige. De verpleegkundige informeert u over hoe de wond geneest en waar u thuis op moet letten.

Vaak ziet de wond er rustig uit. Rond het litteken kan de wond iets verhard en verdikt zijn na de operatie. Ook zijn er soms verkleuringen van de huid: een blauwe plek door een bloedingstorting. Na uw operatie herstelt dit vaak in de

loop van de weken. Houdt u er rekening mee dat de eerste weken:

- het borstgebied vaak eerst doof aanvoelt en
- de pijnklachten - al of niet met pijnmedicatie - meestal wel dragelijk voor u zijn

Tijdelijke prothese

Voordat u met ontslag gaat, meet de oncologie verpleegkundige van de verpleegafdeling de tijdelijke borstprothese bij u aan. Deze is gemaakt van zacht materiaal en is licht van gewicht. Deze prothese is vooral bedoeld voor de eerste 6 tot 8 weken na de operatie. Neem voor het passen van de tijdelijke prothese een beha mee die goed past, met een hele cup en geen beugel, bijvoorbeeld een sportbeha. De wond kan in die periode genezen. Als het wondgebied rustig is en er geen zwelling meer is, kunt u een definitieve uitwendige siliconenprothese aanschaffen. Informatie hierover vindt u in het hoofdstuk over prothesen.

■ Bewegen van de arm- en schouder na borstampuatie

Om de kans op bewegingsbeperking te verkleinen is het belangrijk dat u een aantal dagen na de operatie met arm- en schouderoefeningen begint. Oefeninstructies vindt u elders in deze behandelwijzer onder het hoofdstuk 'Arm- en schouderoefeningen'.

■ Naar huis

Voor zover de pijn het toelaat en u het rustig aan doet, mag u in principe alles doen als u thuis bent. Geef uzelf de gelegenheid om bij te komen van de operatie. Bij problemen, vragen of ongerustheid kunt u altijd contact opnemen met de verpleegkundig consulent/specialist mammacare of buiten kantooruren met de afdeling spoedeisende hulp. Zie voor meer informatie het hoofdstuk 'Adviezen voor thuis na een borstampuatie' in deze behandelwijzer.

Ongeveer 7 werkdagen na de operatie komt u voor controle terug op de borst-kliniek. U heeft dan een afspraak bij de chirurg en de verpleegkundig consulent/specialist mammacare. U krijgt de uitslag van het weefselonderzoek en informatie over de eventuele nabehandeling.

■ Periode van herstel

De operatie en alle spanningen eromheen veroorzaken vaak vermoeidheid. Ook de wondgenezing kost energie. Het is belangrijk dat uw conditie op peil blijft zodat u uw behandeling goed kunt doorstaan. Balans tussen in- en ontspanning draagt bij aan een goed herstel. Voor vragen kunt u terecht bij het mammacare-team. U vindt de telefoonnummers op hoofdstuk 3 van deze behandelwijzer.

■ Uw vragen

Voor vragen kunt u ook in de periode na de behandeling terecht bij de verpleegkundig consulent mammacare / verpleegkundig specialist op de borstkliniek. U vindt de telefoonnummers in hoofdstuk 3 van deze behandelwijzer.